

ISSN 0869-4362

Русский  
орнитологический  
журнал

2014  
XXIII



ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК  
265  
EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал  
The Russian Journal of Ornithology

Издается с 1992 года

Том XXIII

Экспресс-выпуск • Express-issue

2014 № 965

## СОДЕРЖАНИЕ

---

- 355-378 Н.М.Жуков и его вклад в изучение птиц  
Павловского парка и окрестностей.  
И. В. ИЛЬИНСКИЙ
- 378-379 Зимующая серая утка *Anas strepera*  
на реке Красненькой (Санкт-Петербург).  
О. А. СТРОИЛОВ
- 379-382 Успешное нападение сороки *Pica pica*  
на больного сизого голубя *Columba livia*:  
новое свидетельство проявления хищничества.  
Н. Н. БЕРЕЗОВИКОВ
- 382 Бекас-отшельник *Gallinago solitaria*  
к юго-востоку от Ташкента.  
Р. Н. МЕКЛЕНБУРЦЕВ
- 383 Гнездование синей птицы *Myophonus*  
*coeruleus* в заповеднике Аксу-Джабаглы  
в 1971-1973 годах. Б. М. ГУБИН
- 

Редактор и издатель А. В. Бардин

Кафедра зоологии позвоночных  
Биолого-почвенный факультет  
Санкт-Петербургский университет  
Россия 199034 Санкт-Петербург

Р у с с к и й   о р н и т о л о г и ч е с к и й   ж у р н а л  
T h e   R u s s i a n   J o u r n a l   o f   O r n i t h o l o g y  
*Published from 1992*

V o l u m e   X X I I I  
E x p r e s s - i s s u e

2014 № 965

## CONTENTS

---

- 355-378 N.M.Zhukov and his contribution to the study  
of birds of Pavlovsk park and surrounding area.  
I . V . I L J I N S K I
- 378-379 Wintering gadwall *Anas strepera*  
on the Krasnenkaya river (St. Petersburg).  
O . A . S T R O I L O V
- 379-382 Successful attack of the magpie *Pica pica* on sick  
rock pigeon *Columba livia*: new evidence  
of predation. N . N . B E R E Z O V I K O V
- 382 The solitary snipe *Gallinago solitaria*  
in the territory to the south-east of Tashkent.  
R . N . M E K L E N B U R T S E V
- 383 The blue whistling thrush *Myophonus coeruleus*  
nesting in Aksu Dzhabagly in 1971-1973.  
B . M . G U B I N
- 

*A.V.Bardin, Editor and Publisher*  
Department of Vertebrate Zoology  
S.-Petersburg University  
S-Petersburg 199034 Russia

## Н.М.Жуков и его вклад в изучение птиц Павловского парка и окрестностей

И.В.Ильинский

Иван Владимирович Ильинский. Кафедра зоологии позвоночных, биолого-почвенный факультет, Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская набережная, 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия. E-mail: i.iljinsky@bio.spbu.ru

Поступила в редакцию 29 января 2014

Впервые о Николае М[ихайловиче] Жукове я узнал в 1978 году, когда А.С.Мальчевский предложил мне помочь ему в изучении птиц Павловского парка. При обработке собранных материалов и анализе литературных данных выяснилось, что изучение птиц Павловска и его окрестностей было начато в 1870-е годы Е.А.Бихнером. Правда, эти первоначальные сведения не были обширными, они ограничивались лишь указанием на встречи полутора десятка видов птиц на реке Поповке (в 3 км к юго-западу от Павловска), и двух видов (грача и белоспинного дятла) непосредственно в Павловском парке (Бихнер, Плеске 1881; Бихнер 1884). Несравненно более детальные сведения о птицах Павловского парка и его окрестностей были обнаружены в дополнениях В.Л.Бианки к «Списку птиц С.-Петербургской губернии» со ссылкой на наблюдения Н.М.Жукова (Бианки 1917, 1923). Так, в статье 1917 года Бианки приводит данные о встречах Н.М.Жуковым 24 видов птиц (белый аист, кряква, зимняк, луговой лунь, степной лунь, кобчик, чибис, большой кроншнеп, обыкновенная горлица, ушастая сова, сплюшка, мохноногий сыч, ястребиная сова, воробьиный сыч, длиннохвостая и бородатая неясыти, сизоворонка, зимородок, трёхпалый дятел, серый сорокопут, оляпка, ястребиная славка, зарянка, поползень). Ещё по 10 видам (синьга, перепелятник, дербник, малая чайка, клинтух, серая неясыть, белоспинный дятел, крапивник, кедровка, поползень) содержатся материалы в статье 1923 года. Последняя публикация содержит, кроме того, данные для 5 видов (мохноногий сыч, ястребиная сова, воробьиный сыч, бородатая неясыть, трёхпалый дятел), дополняющие сведения, опубликованные в 1917 году. Помимо этого, данные по гнездованию славок (род *Sylvia*), собранные Н.М.Жуковым, были использованы В.Л.Бианки в качестве дополнительного материала в его «Опыте обработки наблюдений над гнездованием птиц...» (Бианки 1922).

Некоторые данные, собранные Н.М. Жуковым, оказались уникальными; они характеризовали либо сравнительно редких и малоизученных птиц, либо были новыми не только для окрестностей Павловска, но и для Санкт-Петербургской губернии в целом. Поэтому эти сведения

использовались не только В.Л. Бианки, но в последующем также А.С. Мальчевским и Ю.Б. Пукинским в сводке «Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий» (1983).

Всё это послужило поводом узнать подробнее о Н.М. Жукове и его исследованиях в Павловском парке. Надежду найти дополнительные материалы давало указание В.Л. Бианки о существовании неопубликованной статьи Н.М. Жукова о птицах Павловского парка (Бианки 1923, с. 127). Однако поиски в библиотеках оказались безрезультатными. Успешным оказалось обращение в научный архив Зоологического института Российской Академии наук. Оказалось, что здесь, в фонде Валентина Львовича Бианки, сохранился не только черновик упомянутой выше статьи (рис. 1), но также и другие материалы, переданные Н.М. Жуковым Валентину Львовичу. Их перечень приведён в этой публикации после списка литературы, а ссылки на них даны в квадратных скобках. Эти материалы позволили не только более полно представить объём исследований Н.М. Жукова, но и составить некоторое представление о его личности.

В этих поисках большую помощь оказали С.В. Меньшикова и сотрудники Научного архива Зоологического института РАН, за что я им искренне благодарен.




Рис. 1. Копии первой и последней страниц рукописи Н.М. Жукова «Список птиц Павловского парка и его окрестностей».

Первые записи Николая Жукова о наблюдениях за птицами в Павловском парке относятся к 1910 году. Летом этого года он сделал запись о первой находке гнезда в парке. Это было гнездо зарянки. Правда, есть ещё одна запись, датированная более ранним годом. Уже позже, при составлении списка птиц Павловского парка, он напишет, что «... в 1908 году сверчок был очень обыкновенен у самой дер. Ново-Весь». Скорее всего, что в эти годы Николай был ещё учащимся среднего учебного заведения, возможно, реального училища. Форма обра-

щения и назидательный тон письма Г.Г.Илюшкина от 22 апреля 1911 из Вологды, адресованного Коле Жукову [8], убеждают нас в справедливости этого предположения.

Где жил Н.М.Жуков в годы, когда он проводил описание птиц Павловского парка? Наиболее вероятно, что в непосредственной близости от него. В пользу этого свидетельствуют сроки и частота посещения парка и его окрестностей. Если ориентироваться только на даты, упомянутые при описании встреч птиц, то за 1912-1915 годы Николай Жуков провёл за наблюдениями птиц не менее 109 дней. Во все сезоны года он находил возможность совершать экскурсии. Минимальная интенсивность наблюдений пришлась на ноябрь и февраль (по одному дню за три года), максимальная – на май и июнь (21 и 23 дня, соответственно).

Обращение к «Алфавитному указателю жителей г. С.-Петербурга, Гатчины, Колпина, Красного Села, Кронштадта, Ораниенбаума, Павловска, Петергофа и Царского Села на 1913 год» позволило обнаружить для Павловска и Царского Села единственный адрес: «Жуков Мих. Павл., Павловск, Конюшенная 9. Т. 30. Мелочн., мясн. и зелень. торг.» (Алфавитный указатель... 1913, с. 224). Вместе с тем, Николай Жуков указывает, что центром его наблюдений служила деревня Ново-Весь, или Ново-Веси [4], расположенная на правом берегу реки Славянки на северной окраине Павловского парка (между парком и дорогой из Царского Села в Ям-Ижору). Не исключено, что эта небольшая деревня, к которой подходит наиболее уединённый конец парка, похожий на лес (см. «Окрестные деревни Царского Села»), могла привлекать Николая тем, что там жил егерь, на помощь которого он неоднократно указывает.

Наблюдения Николая Жукова в период до 1916 года были приурочены главным образом к Павловскому парку и его ближайшим окрестностям. Как исключение, он совершил несколько поездок в деревню Мельницы близ станции Суйда Витебской железной дороги (в 13 км южнее Гатчины), а также в Красное Село.

8 сентября 1915 в его записях впервые появляется запись о том, что он прерывает [на какое-то время] наблюдения в связи с отъездом в Петроград (см. очерк о зимородке). Неизвестно, было ли это связано с поступлением в учебное заведение. Как бы то ни было, интенсивность наблюдений после этого существенно снижается и в 1916 году записи о встречах птиц связаны лишь с 8 датами. Последняя была сделана 6 декабря 1916, после чего наблюдения Н.М.Жукова в Павловском парке прерываются до начала 1918 года.

Однако прежде чем рассмотреть причины этого большого перерыва в наблюдениях, необходимо хотя бы несколько слов сказать о людях, помогавших Н.М.Жукову в его исследованиях. Прежде всего, речь мо-

жет идти о Петре Владимировиче Нестерове. Этот известный зоолог и замечательный педагог в 1909-1919 годах был ассистентом, а затем приват-доцентом кафедры зоологии Санкт-Петербургского (Петроградского) университета. Неизвестно, где произошло знакомство Коли Жукова с П.В.Нестеровым – в университете или в Царском Селе, где Нестеров в 1909-1910 годах преподавал в Царскосельском реальном училище (Шергалин 2011), но, вне сомнения, Пётр Владимирович – великолепный рассказчик и исследователь с богатым опытом научных экспедиций – мог увлечь юношу зоологическими исследованиями. Он же мог познакомить Николая с Валентином Львовичем Бианки, который с 1896 года руководил орнитологическим отделением Зоологического музея Академии наук. Жуков регулярно сообщал Бианки о результатах своих наблюдений. Использовал он и статьи В.Л.Бианки об орнитофауне Санкт-Петербургской губернии в своих исследованиях.

В черновике статьи «Список птиц Павловского парка и его окрестностей» Н.М.Жуков посчитал своим долгом выразить благодарность В.Л.Бианки и П.В.Нестерovu за советы и указания при затруднительных случаях, которые возникали у него при определении птиц и т.п. [4].

В ряде случаев при поиске гнёзд и проведении наблюдений Николаю Жукову помогали его товарищи – Д.Попов и Г.Семёнов; некоторые сведения о совах и дневных хищных птицах он получал от местного егеря.

Зиму 1916/17 года Н.М.Жуков проводит в Петергофе. Об этом можно узнать из его письма от 14 мая 1917, написанного в Новгороде и адресованного В.Л.Бианки [3]. С учётом последующих событий, можно предположить, что в этот период Н.М.Жуков учился в одном из краткосрочных военно-учебных заведений по подготовке офицеров военного времени – прапорщиков. Такие школы были организованы в период Первой мировой войны 1914-1918 годов для ускоренной трёхмесячной подготовки младших офицеров. Четыре школы прапорщиков действовали в эти годы и в Петергофе (РГВИА: Путеводитель, т. 3. 2008).

Судя по дневниковым записям Н.М.Жукова [5], по крайней мере уже 12 апреля 1917 он находится в Новгороде. И в письме от 14 мая 1917 из Новгорода, адресованного В.Л.Бианки [3], и в дневниковых записях [5] нет информации о цели его пребывания в Новгороде, где он находился не менее трёх месяцев. Можно лишь предполагать, что сюда он был направлен в запасный полк, задачей которого была подготовка пополнений для частей действующей армии. Известно, что с началом войны в Новгороде был сформирован 177-й запасный пехотный батальон, развёрнутый в 1916 году в полк, входивший в состав 1-й пехотной запасной бригады. Расквартирован полк был непосредственно в Новгороде – в Манеже и в соседних казармах (Трофимов 1959; Хохлов 2013), на левом берегу Волхова, возле устья реки Гзень. Недалеко

от этого места находилась и квартира, куда Н.М.Жуков просит адресовать ему письма (город Новгород, ул. Козьмодемьянская, д. 19, квартира Струзер) [3].

Из Новгорода он пишет короткое письмо В.Л.Бианки, в котором сообщает о чайках, которых он видел на территории города, в том числе о встреченных 13 мая трёх клушах *Larus fuscus*; сожалеет, что перед отправкой в Новгород дважды заходил в Зоологический музей, но не смог встретиться с Валентином Львовичем [3].

С 10 августа 1917 Н.М. Жуков находится в действующей армии, на Западном фронте. В этот день он приезжает на станцию Краслава (латышски Krāslava). Позднее в рукописи «Список птиц, наблюдавшихся в Двинском уезде...» он напишет, что «с 10 августа (ст. стиль) по 2 сентября и с 24 сентября по 3 декабря 1917 г. (с небольшим перерывом в наблюдениях с 2 по 24 ноября) наблюдал птиц в Двинском уезде Витебской губернии вдоль р. Западная Двина на участке протяжённостью 20-25 вёрст, вглубь страны – 5-10 вёрст, с центром в г. Ливенгоф» [6]. Ливенгоф, или Ливаны (латыш. Līvāni) – это небольшой город на правом берегу Западной Двины, или Даугавы. Два с половиной года, с августа 1915 до февраля 1918 года, этот город находился в полосе непрерывных боёв. На левом берегу Даугавы (на территории Курляндской губернии) стояла немецкая армия, на правом – русская; противники непрерывно обстреливали друг друга (История города Ливаны).

Поразительно, что и в этих условиях, так же как до этого и в Петергофе, и в Новгороде, Н.М.Жуков не прекращает наблюдений за птицами. Немногим более чем за три месяца он составляет список из 60 видов (форм) птиц. Лишь дважды в записях прорывается то обстоятельство, что Николай в этот период находится на фронте. Так, в одном случае он записал: «... слышал пару сов (*Asio accipitrinus*), летавшую где-то около наших проволочных заграждений»; в другом случае: «18 сентября 1917 – стая журавлей около 500 штук... При этом мне солдаты говорили, что они видят журавлей ежедневно».

5 декабря 1917 в городе Брест-Литовске было подписано перемирие; боевые действия на Восточном фронте завершились. Начало 1918 года Н.М.Жуков встречает в Павловске и уже 30 января 1918 в его дневнике появляется запись о добычи самки филина в Павловском парке. До конца июля 1918 года он успевает подготовить «Список птиц, наблюдавшихся в Двинском уезде Витебской губернии [в 1917 году]» [6]; небольшое дополнение к публикациям В.Л.Бианки – «К списку птиц Новгородской губернии [в 1917 году]» и сделать дополнение к «Списку птиц Павловского парка и его окрестностей» [7]. Видимо, к этому же времени относится запись Н.М.Жукова, что ему доставили зелёного дятла (*Gecinus viridis*), добытого в начале мая 1918 года в Тихвинском уезде Новгородской губернии.



Последняя орнитологическая находка была сделана Н.М.Жуковым в Павловском парке 22 июля (4 августа) 1918 – это была запись о гнезде лесной завирушки с кукушонком.

На этом сведения о Н.М.Жукове обрываются...

### Л и т е р а т у р а

- Бианки В.Л. 1917. Третье дополнение к списку птиц С.-Петербургской губернии 1907 г. и новые данные о более редких видах // *Ежегодник Зоол. музея Имп. Акад. наук* **21** (1916), 1: VI-XV.
- Бианки В.Л. 1922. Опыт обработки наблюдений над гнездованием птиц Петроградской губ. // *Ежегодник Зоол. музея Рос. Акад. наук* **22** (1917-191): 167-199.
- Бианки В.Л. 1923. Четвёртое и последнее дополнение к «Списку птиц С.-Петербургской губернии» 1907 года и новые данные о более редких видах // *Ежегодник Зоол. музея Рос. Акад. наук* **24**: 124-139.
- (Бихнер Е.А., Плеске Ф.Д. 1881) Büchner E., Pleske Th. 1881. Beitrage zur Ornithologie des St. Petersburger Gouvernements // *Beitrage zur Kenntniss des Russ. Reichs (St.-Petersb.)*. Folge 2, Bd. IV: 53-178.
- Бихнер Е.А. 1884. Птицы С.-Петербургской губернии: Материалы, литература и критика // *Тр. С.-Петерб. общ-ва естествоиспыт.* **14**, 2: 359-624.
- Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: история, биология, охрана*. Л., 1: 1-480, 2: 1-504.
- Степанян Л.С. 1990. *Конспект орнитологической фауны СССР*. М.: 1-728.
- Шергалин Е.Э. 2011. Пётр Владимирович Нестеров (1883-1941) – орнитолог, географ и педагог // *Рус. орнитол. журн.* **20** (662): 1099-1111.

### Рукописи из научного архива ЗИН РАН, 633-2 Орнитология (фонд В.Л.Бианки)

- [1] Жуков Н.М. «Записи наблюдений над птицами... в Павловском парке»; рукопись от 1914-1915 г. // Научный архив ЗИН РАН, 633-2. Орнитология. 46 листов (в том числе «Записи наблюдений над птицами из отр. Passeriformes в Павловском парке» СПб. отд. Архива РАН. Фонд 309, опись № 2. Ед. хр. 5).
- [2] Жуков Н.М. «Царскосельский уезд Петроградской губернии. Наблюдения с апреля по октябрь 1915 г. »; рукопись от 31.10.1915 // Научный архив ЗИН РАН, 633-2. 3 листа.
- [3] Жуков Н.М. Письмо Валентину Львовичу [Бианки] от 14 мая 1917 г., г. Новгород // Научный архив ЗИН РАН, 633-2. Орнитология. 3 листа.
- [4] Жуков Н.М. «Список птиц Павловского парка и его окрестностей»; рукопись от 1916-1917 гг. // Научный архив ЗИН РАН, 633-2. Орнитология.
- [5] Жуков Н.М. «К списку птиц Новгородской губернии [в 1917 г.];» рукопись от 1917-1918 гг. // Архив ЗИН РАН. 633-2. Орнитология. 1 лист.
- [6] Жуков Н.М. «Список птиц, наблюдавшихся в Двинском уезде Витебской губернии [в 1917 г.]» рукопись от 1917-1918 гг. // Архив ЗИН РАН. 633-2. Орнитология. 6 листов.
- [7] Жуков Н.М. Дополнение к «Списку птиц Павловского парка и его окрестностей»; рукопись от июля 1918 г. // Архив ЗИН РАН. 633-2. Орнитология. 2 листа.
- [8] Письмо Г.Г. Илюшкина от 22 апреля 1911 г. (Вологда), адресованное Н.М.Жукову // Архив ЗИН РАН. 633-2. Орнитология. 1 лист

### М а т е р и а л ы   и н т е р н е т а

- Алфавитный указатель жителей г. С.-Петербурга, Гатчины, Колпина, Красного Села, Кронштадта, Ораниенбаума, Павловска, Петергофа и Царского Села на 1913 год. СПб., изд-во «Тип. А.С. Суворина», 1913. 749 с. // [http://arc.familyspace.ru/archive/Sankt\\_peterburg\\_1913\\_4/](http://arc.familyspace.ru/archive/Sankt_peterburg_1913_4/)
- Мельниченко Н. 2013. Тярлево. Историческая справка // Официальный сайт Муниципального образования посёлок «Тярлево» / <http://mo-tyarlevo.ru/all-info/history>

- Российский государственный военно-исторический архив. Путеводитель. Том 3. 2008. Раздел 19. Фонды военно-учебных заведений // <http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=240&sid=842143>
- История города Ливаны. 2013 // Информационно-новостной ресурс города Ливаны / <http://livani.info/rus/index.php>
- Трофимов С. Новгороду 1100 лет // Новгородский исторический сборник, вып. 9. 1959 / <http://annales.info/rus/novgorod/1100.htm>
- Хохлов И.В. 2013. История новгородского манежа // <http://www.sportmanezh.ru/istoriya-zdaniya.html>

## Приложение

По материалам наблюдений Н.М.Жукова, хранящимся в научном архиве ЗИН РАН (633-2. Орнитология. Фонд В.Л.Бианки), подготовлено описание птиц Павловского парка. За основу публикации взят «Список птиц Павловского парка и его окрестностей» (рукопись 1916-1917 годов) [4], который дополнен сведениями из рукописи 1914-1915 годов «Записи наблюдений над птицами... в Павловском парке» [1], записями из «Царскосельского уезда Петроградской губернии; наблюдения с апреля по октябрь 1915 г.» (рукопись от 31.10.1915) [2] и дополнением к «Списку птиц Павловского парка и его окрестностей» (рукопись от июля 1918) [7]. По возможности, редакция авторского текста сведена к минимуму. Рукописные материалы были также сопоставлены с данными, приведёнными в публикациях Валентина Львовича Бианки (1917, 1922, 1923).

Названия птиц и их порядок соответствуют Конспекту орнитологической фауны СССР (Степанян 1990). При этом сохранены названия птиц, которые использовал Н.М.Жуков (в квадратных скобках). Все даты приведены по старому стилю. Номера в квадратных скобках – порядковые номера документов, указанных в Перечне рукописей Н.М.Жукова, хранящихся в научном архиве ЗИН РАН.

### **Птицы Павловского парка и его окрестностей (1910-1918)**

Н.М.Жуков

Предлагаемые материалы по птицам Павловского парка (Царскосельский уезд Петроградской губернии) и его окрестностей – результат наблюдений Н.М.Жукова, осуществлённых преимущественно в течение 1912-1916 годов, отдельные наблюдения проводились в 1910-1911, некоторые дополнения были сделаны в 1918 году.

Первоначально наблюдения за птицами Н.М.Жуков вёл около деревень Липицы и Ново-Весь Федоровской волости Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии; наблюдения над птицами из отряда Passeriformes – преимущественно в Павловском парке [1]. В последующем, в 1913-1916 годах, центром наблюдений по-прежнему служили деревня Ново-Весь и прилегающая к нему часть Павловского парка. Вместе с тем район наблюдений расширился, им стала местность, ограниченная с севера линией: Царское Село – село Московская Славянка – село Московская Ям-Ижора; с востока – деревня Войскорово – село Федоровское; с юга – деревня Пязелево – деревня Попово, а с запада – деревня Кошелево и уже упомянутое Царское Село (рис. 2). По этому району протекает речка Славянка, а на границе,

приблизительно на протяжении 2 вёрст (2.134 км), река Ижора; кроме того, в начале XX века здесь имелось несколько прудов, служивших местом гнездования уток, и маленькое Липецкое болото, расположенное у дороги Царское Село – Московская Ям-Ижора. Кроме Липецкого болота, имелось обширное болото к юго-востоку от города Павловска, также на самой границе района наблюдений [4].

Кроме парка, для гнездования более или менее крупных птиц служили три маленьких молодых леса. Во всех трёх гнездилась пустельга, в двух – сорока и в одном – ушастая сова. Конечно, кроме перечисленных видов, в них гнездилась и серая ворона [4].




Рис. 2. Фрагмент карты окрестностей Санкт-Петербурга 1909 года с обозначением границы района наблюдений Н.М.Жукова.

***Ciconia ciconia*** (Linnaeus, 1758) Белый аист [*Ciconia ciconia* L.]. 12 апреля 1915 пара аистов целый день летала в Павловском парке [2]

***Anser*** Brisson, 1760 [*Anser* sp.]. Гуси в окрестностях Павловска отмечены на пролёте; нигде здесь не останавливаются [4].

***Cygnus cygnus*** (Linnaeus, 1758) Лебедь-кликун [*Cygnus cygnus* (Linn.)]. Пролётный вид в окрестностях Павловска [4].

***Anas platyrhynchos*** Linnaeus, 1758 Кряква [*Anas boschas* Linn.]. В окрестностях Павловска кряква является оседлой птицей, если её так



можно назвать; по крайней мере, количество птиц, остающихся зимовать больше, чем количество гнездящихся. Гнездится в окрестностях Павловска не более 10-15 пар, тогда как зимует пар 50, а может быть и больше [4]. 2 мая 1913 я нашёл выводок (самка и 12 утят). Кряква, как мне известно, зимует на реке Славянке, по крайней мере, уже второй год. Между зимующими утками есть и самки, хотя их число несколько уступает числу зимующих самцов. Зимой 1914/15 года кряквы зимовали не в таком большом количестве, как в предыдущие годы [1].

***Anas crecca*** Linnaeus, 1758 Чирок-свистунок [*Nettion crecca* (Linn.)]. В окрестностях Павловска гнездится ежегодно, но не более 3 пар; чаще всего гнездится 1-2 пары [4].

***Anas acuta*** Linnaeus, 1758 Шилохвость [*Dafila acuta* (Linn.)]. Пролётный вид в окрестностях Павловска [4].

***Anas querquedula*** Linnaeus, 1758 Чирок-тескунок [*Querquedula querquedula* (Linn.)]. Этот чирок, возможно, гнездится в окрестностях Павловского парка, но встречается значительно реже, чем свистунок *Nettion crecca* [4].

***Melanitta nigra*** (Linnaeus, 1758) Синьга [*Oidemia nigra* (Linn.)]. Однажды была добыта на пролёте на реке Ижоре в окрестностях Павловска [4].

***Pernis apivorus*** (Linnaeus, 1758) Обыкновенный осоед [*Pernis apivorus* (Linn.)]. Осоед в окрестностях Павловска был добыт дважды: самец 30 мая 1914 и juv 17 августа 1914. Летом 1916 года мне часто приходилось наблюдать осоеда в Павловском парке. 12 июля 1916 я наблюдал четырёх осоедов, паривших над парком, через некоторое время они опустились вниз. Здесь они продержались до начала второй трети августа. В начале второй трети августа два из них были добыты, а остальные два улетели [1, 4].

***Circus cyaneus*** (Linnaeus, 1766) Полевой лунь [*Circus cyaneus* Linn.]. Полевой лунь, вероятно, гнездится в окрестностях Павловского парка, но не ежегодно. Обыкновенно же попадает на пролёте [4]. Лунь, добытый 16 июня 1912, находился в периоде сильной линьки. Осенний пролёт происходил во второй половине августа [1].

***Circus macrourus*** (S.G.Gmelin, 1771) Степной лунь [*Circus macrourus* (S.G. Gmel.)]. Обыкновенный пролётный и летующий вид окрестностей Павловска. Появляется здесь в последних числах июля [4]. В 1912 году взрослая птица встречена в окрестностях деревни Ново-Весь Царскосельского уезда 11 августа. У этой птицы были отмечены следы линьки маховых и рулевых [1]. В 1913 году зарегистрировано 3 встречи степного луня, все в окрестностях деревни Ново-Весь: 27 июля 1913 – juv., 1 и 25 августа 1913 – ad. У экземпляров, добытых 1 и 25 августа, также отмечена линька рулевых и маховых [1]. В 1915 году в окрестностях деревни Ново-Весь этого луня добывали дважды: 23 июня и 27

июля, оба *semiad*. У деревни Липицы 17 августа 1915 на меня налетел степной лунь (я отличил его по ровной оранжевой окраске нижней стороны тела) [2].

***Circus pygargus*** (Linnaeus, 1758) Луговой лунь [*Circus pygargus* (Linn.)]. Самец лугового луня добыт из пары егерем 16 мая 1913 в окрестностях деревни Ново-Весь (шкурка этого экземпляра передана в Зоологический музей). Самка после гибели самца ещё долго летала в той же местности [1, 4].

***Accipiter gentilis*** (Linnaeus, 1758) Тетеревятник [*Aster palumbarius* (Linn.)]. Тетеревятник только зимует в окрестностях Павловского парка, появляясь в августе и к апрелю исчезает [4].

***Accipiter nisus*** (Linnaeus, 1758) Перепелятник [*Accipiter nisus* (Linn.)]. Пролётный, очень обыкновенный вид окрестностей Павловска; ежегодно зимует. Встречается здесь не особенно редко и летом, но вряд ли гнездится [4]. Перепелятник начинает осенний пролёт (наблюдения 1912 и 1913 годов) с половины августа, но самым его разгаром следует считать у нас последнюю декаду августа и первую декаду сентября; хотя перепелятник кончает свой настоящий пролёт в сентябре, но он ещё обыкновенен до конца октября. Зимовать остаётся ежегодно, но редок в эту пору. В тёплую зиму 1912/13 года остался зимовать в заметном количестве. За эту зиму (1912/13) известны 2 случая добычи этих ястребков [1]. Зимой 1914/15 года мой друг Д. Попов видел перепелятника 30 ноября и несколько раз в январе (1915). Видимо, тот же экземпляр я наблюдал в январе и, последний раз, 1 марта (1915). [1].

***Buteo lagopus*** (Pontoppidan, 1763) Зимняк [*Archibuteo lagopus* (Gmel.)]. Зимняк встречается на пролёте в окрестностях Павловска довольно часто. Сильный пролёт был осенью 1912 года. Он проходил главным образом во второй трети сентября. Весенний пролёт в 1913 году проходил в последней декаде марта и в первой трети апреля. Осенний пролёт в 1913 году мне совершенно не приходилось наблюдать. За всю осень добыт один экземпляр 29 августа 1913 [1, 4]. Летом 1913 года (18 июня) был убит один зимняк [4]. Он держался недалеко от реки, в лугах, покрытых главным образом вереском и мелким кустарником. В желудке были найдены ящерицы и лягушки [1]. Весною 1915 года, с 9 по 16 апреля, в Павловском парке и его окрестностях были убиты 4 особи. Кроме того, я наблюдал в Павловском парке один экземпляр 18 апреля 1915, а 11 октября 1915 я наблюдал трёх канюков этого вида у деревни Липицы [2].

***Buteo buteo*** (Linnaeus, 1758) Обыкновенный канюк [*Buteo desertorum* (Daud.)]. Пролётный, очень обыкновенный вид окрестностей Павловска. Держится здесь до октября [4]. На гнездовье не замечен мною, хотя летом 1913 и 1914 годов я встречал хищников, по полёту напоминающих сарычей. Летом 1915 года мне приходилось наблюдать сары-

чей в Павловском парке. Канюк, добытый 10 августа 1913 в окрестностях парка, отличался тёмным оперением [1]. Валовый пролёт осенью 1915 года происходил, вероятно, с 19 по 25 августа. В это время была замечена стая, состоявшая из 25 штук. 26 сентября 1915 один экземпляр добыт у колонии Этюп (к востоку от деревни Ново-Весь) [2].

***Falco peregrinus*** Tunstall, 1771 Сапсан [*Falco peregrinus* Tunst.]. Сапсан является пролётным видом в окрестностях Павловска. Я его наблюдал здесь обычно осенью. Летом мне пришлось наблюдать сапсана два раза: 27 июня 1915 у шоссе Царское Село – Ям-Ижора и 8 июля 1916 – в окрестностях Павловского парка [4].

***Falco subbuteo*** Linnaeus, 1758 Чеглок [*Hypotriochis subbuteo* (Linn.)]. В окрестностях Павловского парка чеглок добыт два раза: 20 июня 1913 и 16 апреля 1915 (в последнем случае – самка) [4].

***Falco columbarius*** Linnaeus, 1758 Дербник [*Aesalon aesalon* (Tunst.)]. Обыкновенный пролётный вид в окрестностях Павловского парка; летом 1913 года гнезвился в парке [4].

***Falco vespertinus*** Linnaeus, 1766 Кобчик [*Erythropus vespertinus* (Linn.)]. Самка кобчика добыта в Павловском парке 17 апреля 1915 [2, 4].

***Falco tinnunculus*** Linnaeus, 1758 Обыкновенная пустельга [*Tinnunculus tinnunculus* (Linn.)]. Ежегодно в окрестностях Павловска гнездится не менее 2 пар пустельг. Вылет молодых бывает или в последней трети июня или в первой трети июля [4]. 23 апреля 1913 мною найдена кладка в 3 яйца, вскоре пустельга положила ещё яйцо (4-е). Вылет молодых происходит в последней трети июня и в первой трети июля [1].

***Lagopus lagopus*** (Linnaeus, 1758) Белая куропатка [*Lagopus lagopus* (Linn.)]. Довольно редкий оседлый вид в окрестностях Павловска; зимою встречается чаще [4].

***Lyrurus tetrix*** (Linnaeus, 1758) Тетерев [*Lyrurus tetrix* (Linn.)]. Обыкновенный оседлый вид в окрестностях Павловска [4].

***Perdix perdix*** (Linnaeus, 1758) Серая куропатка [*Perdix perdix* (Linn.)]. Обыкновенный оседлый вид в окрестностях Павловска [4].

***Grus grus*** (Linnaeus, 1758) Серый журавль [*Grus grus* (Linn.)]. Пролётный обыкновенный вид в окрестностях Павловска [4].

***Porzana porzana*** (Linnaeus, 1766) Погоныш [*Porzana porzana* (Linn.)]. Гнездящийся довольно обыкновенный вид в окрестностях Павловска [4].

***Crex crex*** (Linnaeus, 1758) Коростель [*Crex crex* (Linn.)]. Очень обыкновенный гнездящийся вид в окрестностях Павловска. В 1913 году слышал первый крик 6 мая. Совершенно перестаёт кричать в начале июля [4].

***Charadrius dubius*** Scopoli, 1786 Малый зуёк [*Aegialitis dubius*

(Леор.)). 15 июля 1916 я наблюдал один экземпляр малого галстучника на мусорных ямах деревни Кошелево (в 1.5 км западнее Павловска) [4].

***Vanellus vanellus*** (Linnaeus, 1758) Чибис [*Vanellus vanellus* (Linn.)]. Довольно обыкновенная гнездящаяся птица. В окрестностях Павловского парка гнездится приблизительно 3-4 пары. Одна пара постоянно гнездится на болоте у шоссе Царское Село – Московская Ям-Ижора [4]. Весною 1913 года первый чибис в окрестностях деревни Ново-Весь отмечен Н.Н.Поповым, местным жителем, 30 марта [1]. 10 апреля 1913 я наблюдал стайку в 8 экз. на одном из болот в окрестностях парка (у шоссе Царское Село – Московская Ям-Ижора). Этим летом чибисы здесь гнездились. Гнезда его я не нашёл, но всегда, по мере посещения мною болота, я находил пару чибисов, которые носились над болотом и издавали писк вроде: «пиит, пиит!». В последующее время я прервал свои посещения болота и лишь 3 июля 1913, сидя под вечер, опять встретил взрослых птиц, а потом поодиночке двух молодых с ещё плохо отросшими рулями [1]. Летом 1914 года были следующие встречи в окрестностях деревни Ново-Весь: 8 апреля я наблюдал одиночную птицу, 12 апреля Д.Попов видел 5 особей; 20 апреля я обнаружил двух чибисов (20 мая заметил их на этом месте последний раз). Летом 1915 года мне удалось найти их ещё в двух местах: 18 мая 1915 я наблюдал две пары чибисов на юго-запад от села Федоровское и одну пару 11 июня 1915 у шоссе Царское Село – Красное Село, на 10-й версте от Царского Села [2]. Летом 1916 года гнездящихся чибисов в окрестностях Павловского парка было больше, чем в 1913-1915 годах [4].

***Tringa ochropus*** Linnaeus, 1758 Черныш [*Helodromas ochropus* (Linn.)]. Обыкновенный пролётный вид; в окрестностях Павловска держится всё лето [4]. 7 апреля добыта одна самка на реке Тосне [1].

***Tringa glareola*** Linnaeus, 1758 Фифи [*Rhyacophilus glareola* (Gmel.)]. Обыкновенный пролётный вид в окрестностях Павловска [4].

***Tringa erythropus*** (Pallas, 1764) Щёголь [*Totanus fuscus* Linn.]. Пролётный вид в окрестностях Павловска [4].

***Actitis hypoleucos*** (Linnaeus, 1758) Перевозчик [*Tringoides hypoleucos* (Linn.)]. Перевозчик встречается в окрестностях Павловска иногда всё лето, но по большей части его приходится здесь наблюдать на пролёте [4].

***Philomachus pugnax*** (Linnaeus, 1758) Турухтан [*Pavoncella pugnax* (Linn.), или *Machetes pugnax* (L.)]. Обыкновенный пролётный вид в окрестностях Павловска [4]. 4 мая 1915 я наблюдал стайку на Липецком болоте (у шоссе Царское Село – Ям-Ижора), 6 августа 1915 стайку из 40 штук – у самой деревни Ново-Весь [2].

***Calidris temminckii*** (Leisler, 1812) Белохвостый песочник [*Tringa temminckii* Leisl.]. Пролётный вид в окрестностях Павловска [4].

***Calidris alpina*** (Linnaeus, 1758) Чернозобик [*Pelidna alpina*

(Linn.)). Пролётный вид в окрестностях Павловска [4].

***Lymnocyptes minimus*** ([Brunnich], 1764) Гаршнеп [*Lymnocyptes gallinula* (Linn.)]. Пролётный вид в окрестностях Павловска [4].

***Gallinago gallinago*** (Linnaeus, 1758) Бекас [*Gallinago gallinago* (Linn.)]. Довольно обыкновенный гнездящийся вид в окрестностях Павловска [4]. В 1913 году последний раз слышал бляенье бекаса 21 июня [1].

***Gallinago media*** (Latham, 1787) Дупель [*Gallinago major* (Linn.)]. Пролётный вид в окрестностях Павловска, возможно, что дупель гнездится здесь [4].

***Scolopax rusticola*** Linnaeus, 1758 Вальдшнеп [*Scolopax rusticola* Linn.]. Пролётный вид в окрестностях Павловска, возможно, что гнездится здесь [4]. В 1914 году Д.Попов наблюдал в окрестностях Тосно несколько особей 30 марта [1].

***Numenius arquata*** (Linnaeus, 1758) Большой кроншнеп [*Numenius arquata* (Linn.)]. Гнездится на болоте, расположенном к юго-востоку от Павловска и юго-западу от села Федоровское [4]. 14 мая 1915 я наблюдал здесь 5 пар кроншнепов. Одно гнездо удалось найти; оно содержало 3 яйца (одно раздавленное) [2].

***Larus minutus*** Pallas, 1776 Малая чайка [*Hydrocoloeus minutus* (Pall.)]. Добыта пара малых чаек 3 августа 1914 на реке Ижоре южнее Павловска [4].

***Columba palumbus*** Linnaeus, 1758 Вяхирь [*Palumbus palumbus* (Linn.)]. Пролётный, видимо, не очень редкий вид в окрестностях Павловска. Возможно, что гнездится в Павловском парке [4].

***Columba oenas*** Linnaeus, 1758 Клинтух [*Columba oenas* Linn.]. Гнездящийся, довольно обыкновенный вид Павловского парка [4].

***Columba livia*** Gmelin, 1789 Сизый голубь [*Columba livia rustica* Bogd.]. Обыкновенная оседлая птица Павловского парка [4].

***Streptopelia turtur*** (Linnaeus, 1758) Обыкновенная горлица [*Turtur turtur* (Linn.)]. Случайная птица. 7 сентября 1915 одиночная птица была застрелена на поле с овсом в окрестностях деревни Ново-Весь [2, 4]. По свидетельству В.Л.Бианки, это был первый случай залёта горлицы в Петроградскую губернию (Бианки 1917).

***Cuculus canorus*** Linnaeus, 1758 Обыкновенная кукушка [*Cuculus canorus* (Linn.)]. Обыкновенная гнездящаяся птица Павловского парка [4]. В 1913-1914 годах первое кукование Д.Попов слышал 25 апреля. Молодая птица была добыта 24 августа [1]. 22 июля (4 августа) 1918 было найдено гнездо лесной завирушки *Prunella modularis* с «порядочным» птенцом кукушки [4].

***Nyctea scandiaca*** (Linnaeus, 1758) Белая сова [*Nyctea nyctea* (Linn.)]. Эта сова добыта однажды в октябре 1913 года в окрестностях Павловского парка [4].



***Bubo bubo*** (Linnaeus, 1758) Филин [*Bubo bubo* (Linn.)]. 30 января 1918 добыта самка филина в Павловском парке [4].

***Asio otus*** (Linnaeus, 1758) Ушастая сова [*Asio otus* (Linn.)]. Лесная сова принадлежит к обыкновенным гнездящимся птицам Павловского парка и окрестностей, встречается зимой. Вылет птенцов происходит обычно в конце третьей трети июня и первой трети июля [1, 4]. 21 апреля 1913 в окрестностях деревни Липицы Царскосельского уезда была добыта ушастая сова одновременно с болотной совой [1]. За лето 1913 года в окрестностях города Павловска местными жителями найдено не менее 5 гнёзд лесной совы. Из них у меня сведения есть о двух: 1) 16 мая я получил птенца, который был весь в пуху. В начале июня он уже отчасти сбросил свой гнездовой наряд; перья появились главным образом на груди и на брюхе. Вскоре он улетел, но через 3 дня был вновь пойман. 2) 2 июня егерю принесли 4 птенца и взрослую птицу. Гнездо помещалось в старом вороньем гнезде на сосне. Одного из птенцов я взял к себе, он прожил у меня до конца июня и вскоре улетел [1]. 31 августа 1913 поздно вечером егерю удалось добыть из группы, состоящей из 4 экз., 2 особи. Добытые птицы оказались самцами (ad и juv) [1].

В 1914 году в лесу у деревни Ново-Весь мною было найдено 2 гнезда: 1) 3 апреля 1914 – гнездо с 5 яйцами, 8 апреля в нём было уже 7 яиц (20 мая ни яиц, ни птенцов в гнезде не оказалось); 2) 8 апреля 1914 – гнездо с 3 яйцами (два яйца наклюнуты) и 6 птенцами, из которых 5 только что вылупились, а 6-й, старший, уже был способен щёлкать клювом (Бианки 1917). 20 апреля во втором гнезде было обнаружено лишь 5 птенцов; при осмотре один из них выпрыгнул на землю, махая крыльями. Старые совы издавали крик «уэк, уэк!» или же пищали, раскрыв крылья и убегая по земле от гнезда. Недалеко от гнезда я нашёл деревья, которые, вероятно, служили местом отдыха для сов. Внизу под этими деревьями почва богато была усеяна погадками этих птиц. 16 мая 1914 у второго гнезда была застрелена старая птица, а 26 мая – 5 молодых птиц. В этом же году (1914) 20 июня я видел трёх уже окрепших и, наверно, умевших летать (они были в клетке) птенцов. Птицы были взяты где-то в Павловском парке. С середины июля под вечер и вечером ушастые совы посещали деревню Ново-Весь. Например, я наблюдал 15 июля 1914 одну сову, сидевшую на коньке крыши одной из дач. Одна сова была добыта 3 декабря 1914. Этим летом (1914) эти совы были обыкновеннее, чем в предыдущие годы [1].

20 марта 1915 один экземпляр этого вида убит у деревни Липицы (Федоровской волости). 26 марта 1915 я слышал много сов вечером в Павловском парке. 3 июля 1915 в лесу у деревни Ново-Весь добыта молодая сова этого вида со следами пуха [2].

***Asio flammeus*** (Pontoppidan, 1763) Болотная сова [*Asio accipitrinus*

(Pall.)). Болотная сова – обыкновенная гнездящаяся птица в окрестностях Павловского парка. Летом 1914 года она встречалась здесь очень часто. Зимой встречается реже лесной совы *Asio otus* [4]. 21 апреля 1913 болотная сова добыта в окрестностях деревни Липицы, 20 ноября 1913 – в Павловском парке (в последнем случае добыт самец). В 1914 году первая встреча болотной совы произошла 14 апреля (наблюдение Д.Попова). 15 и 18 мая 1914 добыты 2 самца, затем 27 сентября 1914 ещё одна сова [1]. 2 июня 1914 я наблюдал пару болотных сов (днём), отводившую меня от гнезда. Одна из птиц держалась очень низко, а другая – на значительной высоте. Они иногда, взмыв на высоту, закидывали крылья на спину, бросались вниз и производили крыльями хлопающие звуки, а когда я, видимо, близко подходил к гнезду, одна из них бросилась на землю и, распутив крылья, бегала по земле, громко пища. Голос, производимый этими совами, звучал вроде как «и́йк, и́йк», причём между «и» вставлялся какой-то хрипящий горловой звук, так что в целом получалось какое-то тьяканье [1].

***Otus scops*** (Linnaeus, 1758) Сплюшка [*Scops scops* (Linn.)]. Сплюшки появились в Павловском парке, судя по крикам, 17 августа 1915 и держались здесь до 22 августа. Одна из них (молодая птица) 19 августа 1915 была добыта и передана в Зоологический музей [2, 4]. При приведении в порядок шкурки, переданной в музей, оказалось, что череп добытого экземпляра был ещё совершенно мягкий (Бианки 1917).

***Aegolius funereus*** (Linnaeus, 1758) Мохноногий сыч [*Nyctala tengmalmi* (Gm.)]. В Павловском парке эту сову добывали дважды: в середине декабря 1912 года и 13 марта 1916 [1, 4].

***Glaucidium passerinum*** (Linnaeus, 1758) Воробьиный сыч [*Glaucidium passerinum* (Linn.)]. Парочка совок наблюдалась на северной окраине Павловского парка в январе 1915 года, они охотились на чечёток; один из этих сычей был пойман 24 января 1915. Ещё один сычик был добыт 6 марта 1916 [1, 4] – заметим, что у В.Л.Бианки (1917) ошибочно указано 16 марта.

***Surnia ulula*** (Linnaeus, 1758) Ястребиная сова [*Surnia ulula* (Linn.)]. Добыта у деревни Ново-Весь (у северной окраины Павловского парка) 21 августа 1914 [1, 4].

***Strix aluco*** Linnaeus, 1758 Серая неясыть [*Syrnium aluco* (Linn.)]. Серая неясыть является случайным видом Павловского парка. Здесь этот вид добыт два раза: взрослая самка – во второй трети мая 1915 года (в желудке найдены остатки майских жуков и дрозда) и взрослый самец 22 декабря 1915 [2, 4].

***Strix uralensis*** Pallas, 1771 Длиннохвостая неясыть [*Syrnium uralensis* (Pall.)]. 3 сентября 1914 одну длиннохвостую неясыть добыли в окрестностях мызы Небе под Павловском, вторую – 29 сентября в окрестностях Тосны; ещё одну длиннохвостую неясыть в окрестностях

Павловского парка застрелили 22 февраля 1918 [1, 4].

***Strix nebulosa*** Forster, 1772 Бородатая неясыть [*Syrnium lapponicum* (Retz), или *Scotiaptex lapponica* (Retz.)]. Эту неясыть добывали в Павловском парке трижды: самку 5 мая 1915, ещё одну самку 8 октября 1915 (эта особь была передана в Зоологический музей) и самца 11 января 1916 [2, 4]. Кроме того, в окрестностях мызы Небе Царскосельского уезда во второй трети августа было добыто 3 экземпляра [1].

***Caprimulgus europaeus*** Linnaeus, 1758 Обыкновенный козодой [*Caprimulgus europaeus* (Linn.)]. Довольно обыкновенная гнездящаяся птица в окрестностях Павловска [4].

***Apus apus*** (Linnaeus, 1758) Чёрный стриж [*Cypselus apus* (Linn.)]. Гнездящийся, обыкновенный вид Павловска и окрестностей [4]. [В 1914 году] стрижи прилетели 10 мая. Одного стрижа я наблюдал ещё 23 августа [1].

***Coracias garrulus*** Linnaeus, 1758 Сизоворонка [*Coracias garrula* (L.)]. По сообщению егеря, одиночная «голубая сорока» весной 1913 года убита им у деревни Аннолово Кошелевской волости [у В.Л.Бианки (1917) ошибочно указана деревня Аполово], к юго-востоку от Павловска [2].

***Alcedo atthis*** (Linnaeus, 1758) Обыкновенный зимородок [*Alcedo ispida* (Linn.)]. Зимородок в Павловском парке на реке Славянке был обнаружен мною 8 сентября 1915. В последующем он держался здесь до конца сентября (наблюдения Григория Семёнова) [2, 4].

***Jynx torquilla*** Linnaeus, 1758 Вертишейка [*Jynx torquilla* Linn.]. Гнездящаяся обыкновенная птица в окрестностях Павловска [4]. 22 июня 1914 отмечена молодая птица при стариках [1].

***Picus*** Linnaeus, 1758 [*Gecinus* sp.]. Какой-то «зелёный дятел» наблюдался 19 октября 1914 в Павловском парке, где был убит [4].

***Dryocopus martius*** (Linnaeus, 1758) Желна [*Picus martius* Linn.]. Зимующий, обыкновенный вид Павловского парка [4].

***Dendrocopos major*** (Linnaeus, 1758) Большой пёстрый дятел [*Dendrocopos major* (Linn.)]. Оседлый очень редкий вид Павловского парка; зимою становится обыкновенным [4].

***Dendrocopos leucotos*** (Bechstein, 1803) Белоспинный дятел [*Dendrodromas leucotos* (Bechst.)]. В Павловском парке отмечен один раз: 21 сентября 1914 [4].

***Dendrocopos minor*** (Linnaeus, 1758) Малый пёстрый дятел [*Dendrocopos minor* (Linn.)]. Зимующий, редкий вид в окрестностях Павловска [4].

***Picoides tridactylus*** (Linnaeus, 1758) Трёхпалый дятел [*Picoides tridactylus* (Linn.)]. Зимующий, редкий вид Павловского парка, но зимою 1914/15 года был здесь довольно обыкновенен [4]. В 1913 году наблюдал всего 2 раза: 4 января и 30 декабря 1913. Оба раза – по од-

ному экземпляру (судя по окраске – самцы) в парке у деревни Ново-Весь. В последнем случае трёхпалый дятел был добыт. Осенью 1914 года было добыто ещё несколько экземпляров [1].

***Riparia riparia*** (Linnaeus, 1758) Береговая ласточка [*Cotile riparia* (Linn.)]. Гнездящийся, довольно обыкновенный вид в окрестностях Павловска [4].

***Hirundo rustica*** Linnaeus, 1758 Деревенская ласточка [*Hirundo rustica* (Linn.)]. Гнездящийся, очень обыкновенный вид Павловска и окрестностей [4].

***Delichon urbica*** (Linnaeus, 1758) Воронок [*Chelidon urbica* (Linn.)]. Гнездящийся, очень обыкновенный вид Павловска и окрестностей [4].

***Lullula arborea*** (Linnaeus, 1758) Лесной жаворонок [*Lullula arborea* (Linn.)]. В Павловском парке один лесной жаворонок добыт из стайки в 4 особи 19 марта 1918 [4].

***Alauda arvensis*** Linnaeus, 1758 Полевой жаворонок [*Alauda arvensis* Linn.]. Очень обыкновенный гнездящийся вид окрестностей Павловского парка. 19 апреля 1915 в окрестностях деревни Ново-Весь нашёл гнездо с 3 яйцами [4].

***Anthus trivialis*** (Linnaeus, 1758) Лесной конёк [*Anthus trivialis* Linn.]. Довольно обыкновенная гнездящаяся птица Павловского парка [4].

***Anthus pratensis*** (Linnaeus, 1758) Луговой конёк [*Anthus pratensis* Linn.]. Щеврица полевая – очень обыкновенная гнездящаяся птица окрестностей Павловского парка [4]. В 1913 году мною найдены 3 гнезда: 1) 6 мая – во мху на 2 вершка ниже поверхности, с 5 свежими яйцами; 2) 19 мая – с 3 яйцами; 3) 19 мая – на кочковатом болоте, на кочке, с 1 птенцом и 3 яйцами. 9 мая 1914 Д.Попов нашёл гнездо с 5 яйцами (20 мая в этом гнезде были птенцы, 3 июня – вылет) [1].

***Motacilla flava*** Linnaeus, 1758 Жёлтая трясогузка [*Budytes flava flava* (Linn.)]. Обыкновенная плиска – обыкновенная гнездящаяся птица в окрестностях деревни Ново-Весь [4]. В 1913 году встреча двух самцов произошла 10 апреля [1].

***Motacilla alba*** Linnaeus, 1758 Белая трясогузка [*Motacilla alba* Linn.]. Белая трясогузка очень обыкновенная гнездящаяся птица Павловска и окрестностей [4]. 4 мая 1913 найдено гнездо с 1 яйцом (впоследствии их число увеличилось до 6). Гнездо помещалось в вырубке бревна риги [1].

***Lanius collurio*** Linnaeus, 1758 Обыкновенный жулан [*Enneoctonus collurio* (Linn.)]. Гнездящийся обыкновенный вид окрестностей Павловска [4]. 28 мая найдено гнездо с 2 яйцами. 21 июня Д.Попов нашёл гнездо с 3 яйцами и 2 птенцами. 10 июля я наблюдал выводок при стариках [1].

***Lanius excubitor*** Linnaeus, 1758 Серый сорокопуд [*Lanius excubi-*

*tor* Linn.]. Одиночный сорокопут этого вида отмечен 28 августа 1914 у деревни Ново-Весь под Павловском [1, 4].

***Oriolus oriolus*** (Linnaeus, 1758) Обыкновенная иволга [*Oriolus galbula* Linn.]. Обыкновенная гнездящаяся птица Павловского парка [4].

***Sturnus vulgaris*** Linnaeus, 1758 Обыкновенный скворец [*Sturnus sophiae* Bianchi]. Гнездящийся, очень обыкновенный вид Павловска и окрестностей [4].

***Garrulus glandarius*** (Linnaeus, 1758) Сойка [*Garrulus glandarius* (Linn.)]. Редкая оседлая, но обыкновенная зимующая птица Павловского парка [4].

***Pica pica*** (Linnaeus, 1758) Сорока [*Pica pica* (Linn.)]. Оседлая, довольно редкая птица в окрестностях Павловска [4]. 9 июня нашёл гнездо с 4 полуоперёнными птенцами [1].

***Nucifraga caryocatactes*** (Linnaeus, 1758) Кедровка [*Nucifraga caryocatactes* (Linn.)]. Ореховка в Павловском парке появляется случайно: за несколько лет добыта один раз – 10 октября 1913 [4].

***Corvus monedula*** Linnaeus, 1758 Галка [*Coloeus monedula collaris* (Drumm.)]. Оседлый, довольно обыкновенный вид Павловского парка и окрестностей [4].

***Corvus frugilegus*** Linnaeus, 1758 Грач [*Trypanocorax frugilegus* (Linn.)]. Очень обыкновенный гнездящийся вид в окрестностях Павловска. В Павловском парке имеются 2 колонии [4].

***Corvus cornix*** Linnaeus, 1758 Серая ворона [*Corone cornix* (Linn.), или *Corvus cornix* L.]. Оседлый, очень обыкновенный вид Павловского парка и окрестностей [4]. Мною найдены 5 гнёзд; все в 1913 году: 1) 23 апреля – гнездо на сосне, 4 ещё голых и слепых птенца; 2) 6 мая – гнездо с 4 свежими яйцами; 3) 16 мая – гнездо с 4 почти что готовыми к вылету птенцами (это было единственное гнездо, которое помещалось на ели); 4) 16 мая – гнездо с 3 готовыми к вылету птенцами; 5) 24 мая – гнездо в молодой осиновой поросли, между которыми стояли отдельные молодые сосны, оно было так низко, что под него нельзя было подойти, в нём находился в нём только один голый птенец [1].

***Corvus corax*** Linnaeus, 1758 Ворон [*Corvus corax* Linn.]. Оседлый редкий вид в окрестностях Павловска [4].

***Bombycilla garrulus*** (Linnaeus, 1758) Свиристель [*Ampelis garrulus* Linn.]. Пролётная обыкновенная птица, но зимующая лишь изредка в окрестностях Павловска [4].

***Cinclus cinclus*** (Linnaeus, 1758) Оляпка [*Cinclus cinclus* (Linn.)]. Наблюдал парочку этих птичек 30 октября 1910 у незамёрзшего водопada в Павловском парке [1, 4].

***Troglodytes troglodytes*** (Linnaeus, 1758) Крапивник [*Olbiorchilus troglodytes* (Linn.), или *Troglodytes parvulus* (L.)]. Этот вид только лишь

гнездится в Павловском парке, зимою не встречал [4]. Молодых наблюдал в половине июня, главным образом по канавам [1].

***Prunella modularis*** (Linnaeus, 1758) Лесная завирушка [*Accentor modularis* (Linn.)]. Нашёл гнездо лесной завирушки 22 июля (4 августа) 1918 с порядочным птенцом кукушки *Cuculus canorus* в Павловском парке [4].

***Locustella*** Каур, 1829 [*Locustella* sp.]. Сверчок довольно обыкновенный гнездящийся вид, но ежегодно уменьшающийся в числе. В 1908 году он был даже очень обыкновенен у самой деревни Ново-Весь, но с вырубкой кустарника исчез и теперь гнездится лишь к северо-востоку от упомянутой деревни. К какому виду принадлежат эти сверчки, сказать не могу [4].

***Acrocephalus schoenobaenus*** (Linnaeus, 1758) Камышевка-барсучок [*Calamoherpe schoenobaenus* (Linn.), или *Calamodus schoenobaenus* (L.)]. Очень обыкновенный, гнездящийся вид в окрестностях Павловска [4]. В 1913 году видел этих камышевок уже 6 мая; 6 июля — ещё пели. На реке Ижоре 30 июля добыта молодая птица [1].

***Acrocephalus dumetorum*** Blyth, 1849 Садовая камышевка [*Acrocephalus dumetorum* Blyth]. Гнездящийся вид в окрестностях Павловска, но насколько обыкновенен, не известно [4].

***Hippolais icterina*** (Vieillot, 1817) Зелёная пересмешка [*Hypolais hypolais* Linn.]. Обыкновенный гнездящийся вид Павловского парка [4].

***Sylvia nisoria*** (Bechstein, 1795) Ястребиная славка [*Sylvia nisoria* Bechst.]. Редкая гнездящаяся птица в окрестностях деревни Ново-Весь. Наблюдалась и добывалась здесь только летом 1914 года [4]. Пение этой славки продолжалось, по крайней мере, с 28 мая до второй трети июня. Птицы были добыты 19 мая 1914, 4 и 10 июля 1914. Последний раз ястребиную славку я наблюдал в начале августа [1].

***Sylvia atricapilla*** (Linnaeus, 1758) Черноголовая славка [*Sylvia atricapilla* (Linn.)]. Обыкновенный, гнездящийся вид Павловского парка [4]. 25 мая мною найдено гнездо с 5 яйцами (31 мая в нём были птенцы) [1].

***Sylvia borin*** (Boddaert, 1783) Садовая славка [*Sylvia sylvia* (Linn.)]. Очень обыкновенная, гнездящаяся птица Павловского парка [4].

***Sylvia communis*** Latham, 1787 Серая славка [*Sylvia simplex* (Lath.)]. Довольно обыкновенная гнездящаяся птица Павловского парка и окрестностей [4].

***Sylvia curruca*** (Linnaeus, 1758) Славка-завирушка [*Sylvia curruca* (Linn.)]. Довольно обыкновенный гнездящийся вид Павловского парка [4].

***Phylloscopus trochilus*** (Linnaeus, 1758) Пеночка-весничка [*Phylloscopus trochilus* (Linn.)]. Очень обыкновенный гнездящийся вид Пав-



ловского парка [4]. Найдено пять гнёзд этого вида: 1) 5 июля 1911 – с 6 не совсем оперившимися птенцами; 2) 20 мая 1912 – ещё пустое гнездо (1-е яйцо в нём было отложено 23 мая, последнее 31 мая; вылупление птенцов было 13 июня); 3) 14 июня 1913 – с 7 птенцами, которые вылетели 19 июня; 4) 15 июня – с 5 птенцами, только что вылупившимися; 5) 19 июня – с 4 яйцами (1 июля вылупился 1 птенец, остальные яйца при вскрытии оказались засохшими) [1]. В начале августа в тихие ясные ранние утра мне не раз приходилось ещё слышать пение веснички [1].

***Phylloscopus collybita*** (Vieillot, 1817) Пеночка-теньковка [*Phylloscopus rufus* (Bechst.)]. Гнездящийся вид Павловского парка [4].

***Phylloscopus sibilatrix*** (Bechstein, 1793) Пеночка-трещотка [*Phylloscopus sibilatrix* (Bechst.)]. Обыкновенный, гнездящийся вид Павловского парка [4]. Самцы ещё поют во второй трети июня. 19 июня наблюдал птенцов, только что вылетевших из гнезда [1].

***Phylloscopus trochiloides*** (Sundevall, 1837) Зелёная пеночка [*Phylloscopus viridanus* Blyth]. Не сомневаюсь, что гнездо пеночки с 5 яйцами чисто-белого цвета, найденное мною в Павловском парке в 20-х числах мая 1912 года, принадлежало этому виду. Гнездо помещалось на скате, обращённом к западу, недалеко от пруда [4].

***Regulus regulus*** (Linnaeus, 1758) Желтоголовый королёк [*Regulus regulus* (Linn.)]. Очень обыкновенный оседлый вид парка [4].

***Ficedula hypoleuca*** (Pallas, 1764) Мухоловка-пеструшка [*Hedymela atricapilla* (Linn.), или *Muscicapa atricapilla* L.]. Гнездящийся очень обыкновенный вид парка [4]. Вылет молодых начинается в последней трети июня и ещё продолжается в первой трети июля. Нашёл несколько гнёзд: 1) 22 мая 1913 – кладка из 5 яиц; 2) 20 мая 1914 – 6 яиц; 3) 25 мая – самка крепко сидит, определить число яиц не удалось; 4) 25 мая – 6 яиц; 4) 10 июня – 4 яйца. Все гнёзда устроены в дуплах берёзы [1].

***Ficedula parva*** (Bechstein, 1794) Малая мухоловка [*Siphia parva* (Bechst.)]. Гнездящийся, вероятно, редкий вид Павловского парка [4].

***Muscicapa striata*** (Pallas, 1764) Серая мухоловка [*Muscicapa grisola* (Linn.)]. Гнездящаяся обыкновенная птица Павловского парка. [4]. Вылет птенцов происходит со второй трети июня по первую треть июля, а может быть и дольше [1].

***Saxicola rubetra*** (Linnaeus, 1758) Луговой чекан [*Pratincola rubetra* (Linn.)]. Гнездящийся обыкновенный вид в окрестностях Павловска [4]. 1 июня 1913 было найдено гнездо с 5 только что вылупившимися птенцами [1].

***Oenanthe oenanthe*** (Linnaeus, 1758) Обыкновенная каменка [*Saxicola oenanthe* Linn.]. Гнездящийся, довольно обыкновенный вид в окрестностях Павловска. Гнездится главным образом в сложенных

камнях шоссе-ных дорог, благодаря этому и численность гнездящихся птиц колеблется в зависимости от числа куч [4].

***Phoenicurus phoenicurus*** (Linnaeus, 1758) Обыкновенная горихвостка [*Ruticilla phoenicura* (Linn.), или *Buticilla phoenicura* (L.)]. Гнездящийся обыкновенный вид Павловского парка [4]. Нашёл кладку из 6 яиц в первой половине июня 1913 года. Впоследствии яйца были съедены белкой *Sciurus vulgaris*. Вылет молодых начинается со второй трети июня и продолжается в первых числах июля [1].

***Erithacus rubecula*** (Linnaeus, 1758) Зарянка [*Erithacus rubecula* Linn.]. Гнездящийся обыкновенный вид парка [4]. Найдены 3 гнезда: 1) в июне 1910 – гнездо с 7 полуоперившимися птенцами; 2) 12 июня 1911 – гнездо с 6 также полуоперившимися птенцами; 3) 19 мая 1912 – гнездо с 1 яйцом (кладка в этом гнезде продолжалась до 27 мая, когда было положено последнее, 7-е яйцо; вскоре гнездо было разорено) [1]. 29 апреля 1913 из группы, состоящей из трёх зарянок, одна была добыта; в её желудке были найдены фрагменты жесткокрылых насекомых [1]. 11 октября 1915 в Павловском парке были зарегистрированы поодиночке 4 зарянки [2].

***Luscinia luscinia*** (Linnaeus, 1758) Обыкновенный соловей [*Luscinia philomela* Lechst.]. Гнездящийся обыкновенный вид парка [4].

***Turdus pilaris*** Linnaeus, 1758 Рябинник [*Turdus pilaris* Linn.]. Гнездящийся и зимующий, очень обыкновенный вид [4]. Осмотрены два гнезда: 1) 4 мая 1913 – с 6 яйцами; 2) 2 июня 1914 – гнездо с 7 яйцами (20 июня птенцы вылетели). Вылет начинается со второй трети мая и продолжается в первых числах июня. В 1913-1914 годах массовый вылет птенцов из гнёзд происходил 24-25 мая [1]. В некотором количестве дрозды-рябинники держались ещё 17-21 октября [1].

***Turdus iliacus*** Linnaeus, 1766 Белобровик [*Turdus iliacus* Linn.]. Гнездящийся, очень обыкновенный вид Павловского парка. По численности гнездящихся птиц этот дрозд идёт первым за *T. pilaris* [4]. Гнезда, найденные мною, были следующие: 1) 4 мая 1913 – гнездо с 5 яйцами; 2) 4 июня 1914 – 5 готовых к вылету птенцов (5 июня вылет); 3) 4 июня 1914 – 5 молодых птенцов; 4) 10 июня 1914 – 5 яиц; 5) 12 июня 1914 – 5 яиц; 6) 12 июня 1914 – 5 только что вылупившихся птенцов; 7) 22 июня 1914 – 5 яиц. Вылет птенцов происходит начиная с последней трети мая. 1 июля 1914 наблюдал одного не умевшего летать птенца [1]. Несколько гнёзд, которые принадлежали *T. iliacus*, помещались на ветвях упавших деревьев. Одно из гнёзд помещалось наверху в корнях упавшей сосны [1].

***Turdus philomelos*** C.L. Brehm, 1831 Певчий дрозд [*Turdus musicus* Linn.]. Гнездящийся, довольно обыкновенный вид Павловского парка [4]. 1 июля было найдено гнездо с 3 только что вылупившимися птенцами [1].

***Turdus viscivorus*** Linnaeus, 1758 Деряба [*Turdus viscivorus* Linn.]. Гнездящийся, видимо, редкий вид Павловского парка [4].

***Aegithalos caudatus*** (Linnaeus, 1758) Длиннохвостая синица [*Aegithalos caudatus* (Linn.)]. Длиннохвостая синица была очень обыкновенна осенью 1912 года в Павловском парке. Кроме этой осени, я наблюдал одиночку 13 февраля 1914 [4].

***Parus montanus*** Baldenstein, 1827 Буроголовая гаичка [*Poecile borealis* de Sélys Longchamps]. Очень обыкновенный оседлый вид Павловского парка [4].

***Parus cristatus*** Linnaeus, 1758 Хохлатая синица [*Lophophanes cristatus* (Linn.)]. Оседлая, довольно редкая птица парка [4].

***Parus ater*** Linnaeus, 1758 Московка [*Periparus ater* (Linn.)]. Зимующая, довольно обыкновенная птица Павловского парка [4].

***Parus caeruleus*** Linnaeus, 1758 Обыкновенная лазоревка [*Cyanistes caeruleus* (Linn.)]. Зимующий, довольно обыкновенный вид парка [4].

***Parus major*** Linnaeus, 1758 Большая синица [*Parus major* Linn.]. Оседлая, очень обыкновенная птица Павловского парка [4]. 4 июня найдено гнездо с 4 готовыми к вылету птенцами. Молодые птицы вылетают в первой трети июня [1].

***Sitta europaea*** Linnaeus, 1758 Обыкновенный поползень [*Sitta europaea* Linn.]. Поползень встречается в Павловском парке с середины августа по март, поодиночке, реже парочками. В общем, это редкая зимующая птица [4]. Один экземпляр наблюдал 21 октября 1914 в стайке синиц [1].

***Certhia familiaris*** Linnaeus, 1758 Обыкновенная пищуха [*Certhia familiaris* Linn.]. Очень обыкновенный оседлый вид Павловского парка [4]. Мною найдено 2 гнезда; оба в дупле берёзы: 1) 20 мая 1912 с 7 яйцами, и 17 мая 1913 с 5 птенцами, готовыми к вылету [1].

***Passer domesticus*** (Linnaeus, 1758) Домовый воробей [*Passer domesticus* Linn.]. Очень обыкновенная оседлая птица парка [4].

***Passer montanus*** (Linnaeus, 1758) Полевой воробей [*Passer montanus* Linn.]. Обыкновенный оседлый вид Павловского парка [4].

***Fringilla coelebs*** Linnaeus, 1758 Зяблик [*Fringilla coelebs* Linn.]. Зяблик — очень обыкновенный гнездящийся вид Павловского парка. Один экземпляр наблюдал 6 декабря 1915 [4].

***Fringilla montifringilla*** Linnaeus, 1758 Вьюрок [*Fringilla montifringilla* Linn.]. Вьюрок добыт в Павловском парке 1 октября 1915 [4].

***Chloris chloris*** (Linnaeus, 1758) Обыкновенная зеленушка [*Chloris chloris* (Linn.)]. Редкая гнездящаяся птица Павловского парка. Зимой наблюдал 30 декабря 1913 [4].

***Spinus spinus*** (Linnaeus, 1758) Чиж [*Chrysomitris spinus* (Linn.)]. Оседлый обыкновенный вид Павловского парка [4].

***Carduelis carduelis*** (Linnaeus, 1758) Черноголовый щегол [*Cardue-*

*lis carduelis* (Linn.)). Довольно обыкновенный оседлый вид парка [4].

***Acanthis cannabina*** (Linnaeus, 1758) Коноплянка [*Cannabina cannabina* (Linn.)]. Обыкновенная гнездящаяся птица парка [4].

***Acanthis flammea*** (Linnaeus, 1758) Обыкновенная чечётка [*Acanthis linaria linaria* Linn.]. Обыкновенная зимующая птица парка [4].

***Acanthis hornemanni*** (Holboell, 1843) Пепельная чечётка [*Acanthis linaria holboellii* (Brehm)]. Длинноклювая чечётка была добыта в Павловском парке 17 октября и 6 декабря 1916 [4].

***Carpodacus erythrinus*** (Pallas, 1770) Обыкновенная чечевица [*Carpodacus erythrinus* (Pall.)]. Довольно обыкновенная птица; гнездится в Павловском парке и окрестностях [4]. В 1913-1914 годах было найдено два гнезда: 1) 13 июня – с 2 яйцами (14 июня было уже 3 яйца, а 15 июня птица бросила гнездо); 2) 21 июня – с 3 яйцами [1].

***Pinicola enucleator*** (Linnaeus, 1758) Щур [*Pinicola enucleator* (Linn.)]. Щур в окрестностях деревни Ново-Весь наблюдался осенью 1913 года [4].

***Loxia curvirostra*** Linnaeus, 1758 Обыкновенный клёт [Loxia curvirostra Linn.]. Оседлый вид Павловского парка и окрестностей. В 1913-1916 годах численность клестов была непостоянна. 13 марта 1916 в Павловском парке был пойман птенец [4].

***Pyrrhula pyrrhula*** (Linnaeus, 1758) Обыкновенный снегирь [*Pyrrhula pyrrhula* (Linn.)]. Снегирь довольно обыкновенный оседлый вид Павловского парка [4].

***Emberiza citrinella*** Linnaeus, 1758 Обыкновенная овсянка [*Emberiza citrinella* Linn.]. Обыкновенный оседлый вид Павловского парка и окрестностей [4]. В 1913-1914 годах найдено два гнезда: 1) 5 июня – гнездо с 3 яйцами; 2) 26 июня – гнездо с 5 яйцами (к 6 июля оно было разорено). Начало вылета птенцов – в конце мая и в начале июня [1].

***Emberiza schoeniclus*** (Linnaeus, 1758) Тростниковая овсянка [*Cynchramus schoeniclus* (Linn.)]. Болотная овсянка гнездится и обыкновенна в окрестностях деревни Ново-Весь [4]. 23 июня 1914 был пойман птенец, ещё не умеющий летать [1].

***Plectrophenax nivalis*** (Linnaeus, 1758) Пуночка [*Plectrophenax nivalis* (Linn.)]. В окрестностях Павловска пуночка встречается на весеннем и осеннем пролётах [4].

★ ★ ★

Таким образом, Н.М.Жуков в период с 1910 по 1918 год на территории Павловского парка и в его окрестностях зарегистрировал 144 вида птиц. Из них для 82 видов сделано указание, что эти птицы гнездятся в данном районе, а для 29 видов это подкреплено находкой гнёзд или выводков. Н.М.Жуков обратил внимание на то обстоятельство, что обособленность района его наблюдений от больших лесов сказалась на разнообразии птиц. Некоторые птицы, являясь обычными оседлыми,

гнездящимися в Санкт-Петербургской губернии, в окрестностях Павловска отсутствовали или же гнездились, или посещали этот район в незначительном количестве, например, различные виды дятлов [4].



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2014, Том 23, Экспресс-выпуск 965: 378-379

## Зимующая серая утка *Anas strepera* на реке Красненькой (Санкт-Петербург)

О.А.Строилов

Олег Александрович Строилов. Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей.  
E-mail: osa1973@inbox.ru

Поступила в редакцию 29 января 2014

Серая утка *Anas strepera* начала активно осваивать территорию города Санкт-Петербурга с начала 2000-х годов (Иовченко и др. 2013). Как сообщает Н.П.Иовченко (2013), в 2013 году серая утка была встречена осенью необычно поздно: одиночный самец держался в Московском парке Победы по крайней мере до 23 ноября. В связи с этим добавлю, что ещё в 2003 году я видел в этом парке самца серой утки 23 ноября. Кроме позднеосенней встречи, зимой 2013/14 года впервые удалось наблюдать и зимовку серой утки в Санкт-Петербурге – в низовьях незамерзающей речки Красненькой (в 8.5 км к западу от Московского парка Победы). Здесь один самец этого вида встречен 18 и 27 января 2014 среди зимующих крякв *Anas platyrhynchos* и других водяных птиц (рис. 1 и 2).



Рис. 1. Скопление уток и чакв на реке Красненькой. Санкт-Петербург, 18 января 2014. Фото автора.





Рис. 2. Самец серой утки *Ana strepera* в низовьях реки Красненькой.  
Санкт-Петербург, 18 января 2014. Фото автора.

### Л и т е р а т у р а

- Иовченко Н.П. 2013. Поздняя осенняя встреча серой утки *Anas strepera* в Санкт-Петербурге // *Рус. орнитол. журн.* **22** (947): 3320-3322.
- Иовченко Н.П., Рычкова А.Л., Смирнов О.П. 2013. Стремительное освоение водоёмов Санкт-Петербурга серой уткой *Anas strepera* в начале XXI века // *Рус. орнитол. журн.* **22** (916): 2440-2441.



ISSN 0869-4362

*Русский орнитологический журнал* 2014, Том 23, Экспресс-выпуск **965**: 379-382

## **Успешное нападение сороки *Pica pica* на больного сизого голубя *Columba livia*: новое свидетельство проявления хищничества**

**Н.Н.Березовиков**

*Николай Николаевич Березовиков.* Лаборатория орнитологии и герпетологии, Институт зоологии Министерства образования и науки, проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан.  
E-mail: berezovikov\_n@mail.ru

*Поступила в редакцию 29 января 2014*

В кормовом поведении сороки *Pica pica* хищничество по отношению другим видам птиц занимает немаловажное место. Уже давно замечено, что сороки одними из первых реагируют на изменение поведения птиц, особенно больных или подранков, предпринимая попытки добить их (Березовиков 2005, 2006).

В одном из скверов города Караганды 19 сентября 2011 среди кормящихся на тротуаре голубей *Columba livia* var. *domestica* был замечен один больной, лишившийся по каким-то причинам правого глаза,









Рис. 1-4. Сцена убийства сорокой *Pica pica* голубя *Columba livia*.  
Караганда. 19 сентября 2011. Фото И.Таболиной



Рис. 5. Сорока *Pica pica*, поедающая голубя *Columba livia*.  
Караганда. 31 августа 2012. Фото И.Таболиной.

покрытого свежей коростой. Птица была слабой, вялой и передвигалась неуверенной походкой. Вскоре около голубей появилась сорока, которая, имитируя кормление, некоторое время скакала среди них, высоко задрав хвост. Приблизившись вплотную к больной птице, она неожиданно нанесла ей серию клевков по голове, целясь в глаза. Ошеломив и ослепив голубя, сорока крепко вцепилась лапами сверху в оба крыла, придавила его массой своего тела и продолжала наносить ему сильные удары клювом по темени, шее и глазам, содрав на голове кожу до крови. Голубь оказывал активное сопротивление и, пытаясь

вырваться из лап хищницы, отчаянно хлопал крыльями, пытаясь сбросить её с себя. При этом они несколько раз клубком перевернулись по асфальту. Когда голубь прекратил сопротивляться, затих, лишь изредка конвульсивно дёргаясь, сорока, устало открыв клюв и усиленно дыша, около минуты отдыхала рядом с жертвой, осматриваясь по сторонам (рис. 1-4). Увидев приближающихся по аллее людей, она улетила в соседние древесные насаждения. На следующий год, 31 августа, в центральном парке Караганды встречена сорока, поедающая сизого голубя. Судя по всему, он также был её жертвой (рис. 5).

Автор выражает признательность И. Таболиной (г. Караганда), любезно предоставившей фотографии для этой публикации.

### Литература

- Березовиков Н.Н. 2005. Случаи проявления хищничества у сороки *Pica pica* на Алтае // *Рус. орнитол. журн.* 14 (293): 627-628.  
Березовиков Н.Н. 2006. Явление коллективного хищничества сорок *Pica pica* и чёрных ворон *Corvus corone* // *Рус. орнитол. журн.* 15 (318): 466-467.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2014, Том 23, Экспресс-выпуск 965: 382

## Бекас-отшельник *Gallinago solitaria* к юго-востоку от Ташкента

Р.Н. Мекленбурцев

Второе издание. Первая публикация в 1976\*

В 60-65 км к юго-востоку от Ташкента в последние 10-12 лет каждую зиму охотники, посещающие притоки реки Ангрен, сообщают о встречах с бекасом-отшельником *Gallinago solitaria*. В течение охотничьего сезона, т.е. первой половины зимы, несколько особей обычно добываются. Эти кулики держатся по берегам небольших горных ручьёв с каменистыми руслами. Мною этот вид был отмечен 19 января 1961 в долине реки Сох на северном склоне Алайского хребта, несколько ниже кишлака Сох. Бекас держался на незамерзающем небольшом разливе родниковых вод. Здесь было мягкое дно, и весь разлив покрывался невысокой зелёной травой, хотя кругом лежал снег.



\* Мекленбурцев Р.Н. 1976. Краткие сообщения о бекасе-отшельнике: К юго-востоку от Ташкента // *Тр. Окского заповедника* 13: 144-145.

## Гнездование синей птицы *Myorhonus coeruleus* в заповеднике Аксу-Джабаглы в 1971-1973 годах

Б.М.Губин

Второе издание. Первая публикация в 1991\*

В заповеднике Аксу-Джабаглы (Таласский Алатау, Западный Тянь-Шань) на местах гнездования синих птиц *Myorhonus coeruleus* встречали в 1972 году с 14 апреля по 17 декабря, в 1973 – с 25 марта по 22 сентября. В 1971-1973 годах на участке в 6 км от кордона Джабаглы до Улькен-Каинды найдено 6 гнёзд, из которых 2 сооружены в бетонных водозаборниках, 3 – в устьях рек Кши-Каинды, Улькен-Каинды и Байбарак на скалах и 1 – в скалах водопада Кши-Каинды. Расстояния между гнёздами составляли от 0.5 до 2 км.

В устье речки Жетымсай под бетонным арыком пара гнездилась два года подряд. Гнездо, найденное 3 июня 1971, содержало 4 яйца, из которых к 6 июня вылупились птенцы, покинувшие его 28 июня. Здесь же в 1972 году 29 апреля пара достраивала гнездо, 5 мая самка отложила первое яйцо (полная кладка содержала 6 яиц), в конце месяца вылупилось 4 птенца, которые оставили гнездо к концу второй декады июня.

В устье реки Кши-Каинды 9 мая 1972 найдено пустое гнездо, в которое затем было отложено 5 яиц. Вывелись 4 птенца, вылетевшие в первой декаде июня. В 1973 году здесь же 7 мая найдена кладка из 4 яиц и концу первой декады июня вылетели 4 птенца. В устье Кши-Каинды, близ жилого гнезда, устроенного на прошлогоднем, найдены ещё 2 старых. В гнезде в устье речки Байбарак первое яйцо было отложено 18 мая 1973, а 14 июня находились 3 насиженных яйца и перья от самки, съеденной на гнезде, по-видимому, куницей. На водозаборной плотине Джабаглы, уже в 500 м по выходу реки из ущелья, 7 июня 1973 найдено гнездо с 4 яйцами, из которых 9 июня вылупилось 3, а 10 июня – последний, четвёртый птенец. 22 июня гнездо было пустым, под ним найден оперённый мёртвый птенец, видимо, выпавший из гнезда.



\* Губин Б.М. 1991. Краткие сообщения о синей птице [Чимкентская область]  
// *Редкие птицы и звери Казахстана*. Алма-Ата: 254-255.