

ISSN 0869-4362

Русский
орнитологический
журнал

2014
XXIII



ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
973
EXPRESS-ISSUE

2014 № 973

СОДЕРЖАНИЕ

- 597-633 Материалы авифаунистического обследования национального парка «Плещеево озеро» (юг Ярославской области).
С. В. ГОЛУБЕВ, А. А. РУСИНОВ
- 633-634 Зимняя встреча синей птицы *Myophonus coeruleus* в заповеднике Аксу-Джабаглы. А. Ф. КОВШАРЬ
- 634 Нахождение синей птицы *Myophonus coeruleus* в ущельях северного склона Киргизского Алатау (Южный Казахстан). В. Г. КОЛБИНЦЕВ
- 634-635 Замечание к статье С. Л. Волкова «Пролёт птиц в долине реки Витим в 2012 году» в Амурском зоологическом журнале. С. Л. ВОЛКОВ
- 635-637 Зимняя встреча озёрной чайки *Larus ridibundus* на реке Каратал в окрестностях Талдыкоргана (Юго-Восточный Казахстан).
Н. Н. БЕРЕЗОВИКОВ, А. И. БЕЛЯЕВ
- 637 Летние находения савки *Oxyura leucoserphala* в низовьях Тургая (Актюбинская область).
В. Г. БЕРЕЗОВСКИЙ
-

Редактор и издатель А. В. Бардин

Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

C O N T E N T S

- 597-633 The survey of bird fauna of the national park
«Pleshcheyevo Lake» (south of Yaroslavl Oblast).
S . V . G O L U B E V , A . A . R U S I N O V
- 633-634 Winter record of the blue whistling thrush
Myophonus coeruleus in Aksu Dzhabagly.
A . F . K O V S H A R
- 634 Finding the blue whistling thrush *Myophonus*
coeruleus in the gorges of the northern slope
of the Kyrgyz Alatau (Southern Kazakhstan).
V . G . K O L B I N T S E V
- 634-635 Note to Article «Passage of birds in the Vitim river
valley in 2012» by S.L.Volkov in the Amur Journal
of Zoology. S . L . V O L K O V
- 635-637 Winter record of the black-headed gull *Larus*
ridibundus on Karatal River near Taldykorgan
(South-Eastern Kazakhstan).
N . N . B E R E Z O V I K O V , A . I . B E L Y A E V
- 637 Summer records of the white-headed duck *Oxyura*
leucocephala in the lower reaches of Turgay.
V . G . B E R E Z O V S K Y
-

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St.-Petersburg University
St.-Petersburg 199034 Russia

Материалы авифаунистического обследования национального парка «Плещеево озеро» (юг Ярославской области)

С.В.Голубев, А.А.Русинов

Сергей Владимирович Голубев. Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова,
проезд Матросова, д. 9, факультет биологии и экологии, Ярославль, 150057, Россия;
E-mail: gol_arctic@mail.ru

Александр Александрович Русинов. Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова,
проезд Матросова, д. 9, факультет биологии и экологии, Ярославль, 150057, Россия;
E-mail: aleksrusynov@rambler.ru

Поступила в редакцию 18 февраля 2014

Национальный парк «Плещеево озеро» образован в 1988 году Постановлением Совета Министров РСФСР от 26 сентября 1988 года с целью сохранения и восстановления уникального природно-исторического комплекса. Он расположен в Переславском районе Ярославской области, в 130 км к северо-востоку от Москвы. Общая площадь, занимаемая парком – 23790 га. В его состав входит озеро Плещеево, его побережье и окружающие лесные массивы. Леса занимают около 48% территории парка и представлены хвойными, мелколиственными и смешанно-широколиственными типами. Значительная часть лесов в той или иной степени заболочена.

Материал и методика

Обзор литературы, посвящённой изучению птиц Переславщины, в том числе и птиц котловины озера Плещеево и его окрестностей, был подготовлен нами ранее (Голубев 2011). Напомним лишь, что первый список птиц бывшего Переславль-Залесского уезда составил В.А.Варенцов (1919). Впоследствии список был существенно дополнен многолетним обследованием Переславщины известными московскими орнитологами Е.С.Птушенко и Н.А.Гладковым (Птушенко 1937; Птушенко, Гладков 1933; Гладков, Птушенко 1934). Отрывочные сведения можно найти в монографии по птицам Московской области (Птушенко, Иноземцев 1968) и прочих изданиях. После 1935 года, насколько нам известно, детальные орнитологические наблюдения в этой местности никто не проводил.

Материалы для данной статьи собраны авторами на территории национального парка «Плещеево озеро» (далее НП «Плещеево озеро») в период с 1988 по 2014 год. В этот период национальный парк посещался краткосрочно, но неоднократно. Наиболее детальное обследование рассматриваемой территории проведено в 2013 году. Большая часть материала собрана в весенне-летний период. Орнитологическому обследованию подверглись котловина озера Плещеево, его побережье и прилегающие к озеру ландшафты. Необследованными остались южные и юго-западные участки этой ООПТ. В ходе работ мы использовали данные опросов сотрудников НП «Плещеево озеро» и местных жителей. В статью также включены сообщения некоторых наших респондентов, кратковременно посещавших эту местность.

Комплексные маршрутные учёты птиц проводились нами с учётом «Методических рекомендаций...» Е.С.Равкина и Н.Г.Челинцева (1990). Учёты проводились в предгнездовой и гнездовой периоды 2013 года. Суммарная протяжённость пеших маршрутов, пройденных с учётами птиц, составила 109.89 км.

В тексте статьи указаны географические координаты мест расположения колоний птиц и встреч отдельных редких или уязвимых видов, полученные с помощью GPS-навигатора. Для удобства восприятия информации мы приводим карту-схему НП «Плещеево озеро» (см. рисунок) с указанием на ней основных географических и прочих объектов, упоминаемых в тексте.

Русские и латинские названия видов, а также последовательность расположения таксонов приведены в соответствии с монографией Л.С.Степаняна (2003). Для видов, занесённых в Красную книгу Ярославской области, категории редкости приведены в соответствии с «Бюллетенем по Красной книге...» (2010).



Карта-схема национального парка «Плещеево озеро»

Видовые очерки

Красношейная поганка *Podiceps auritus*. Пара держалась 24 мая 1995 у западного побережья озера Плещеево в районе урочища Симак. Вид внесен в 3-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Чомга *Podiceps cristatus*. 26–27 апреля 1995 одиночки и пары неоднократно регистрировались вдоль западного побережья озера Плещеево. В 2013 году 30 апреля одиночная птица держалась на промоине у западного берега озера в урочище Симак. 24 апреля 2013 на 12 км маршруте по побережью озера между пионерским лагерем Сосновый и Переславлем-Залесским учтены 3 пары (0.5 ос/км).

Большая выпь *Botaurus stellaris*. В 2013 году голос самца слышали 30 апреля в тростниковых зарослях поймы реки Векса, другой самец «бúхал» в тростниках Блудова болота. 24 мая на 12 км отрезке побережья озера Плещеево между пионерским лагерем Сосновый и Переславлем-Залесским зарегистрированы голоса 4 самцов (0.33 ос./км).

Серая цапля *Ardea cinerea*. По свидетельству В.П.Семерного, первый факт гнездования серой цапли на побережье озера Плещеево установлен им летом 1990 года на западном берегу озера в урочище Симак, недалеко от станции экологического мониторинга. Гнездо располагалось в смешанном лесу на сосне. В гнезде находились 3 птенца, благополучно покинувших его впоследствии. В последующие годы цапли на западном берегу озера, насколько нам известно, не гнездились.

Одиночные жилые гнёзда серых цапель на берегу озера Плещеево в урочище Кухмарь (пионерский лагерь Сосновый) были известны нам с 1993 года. До 1998 года гнездование вида на озере было единичным и нерегулярным. В дальнейшем, по свидетельству В.Б.Охотина, в вышеуказанном месте цапли приступили к колониальному гнездованию, и в последующие несколько лет им обнаруживались по 2 или 3 жилых гнёзда. К сожалению, динамика роста численности колонии прослежена не была. В ходе обследования колонии серых цапель, произведённого нами 12 апреля и 24 мая 2013, выявлено 38 жилых гнёзд, 4 из которых впоследствии упали на землю. Помимо этого, обнаружено ещё 8 гнёзд, упавших в предшествующие годы. Все осмотренные гнёзда располагались на соснах на высоте не ниже 12-14 м от земли. Почти на каждом дереве размещалось по 1 гнезду. Исключение составили две сосны, на которых было по 2 гнёзда. Среди осмотренных гнёзд выделялись отдельные массивные многолетние постройки.

В настоящее время колония размещена в месте обнаружения первых гнёзд серых цапель на северном берегу озера Плещеево в точке с координатами 56° 48' 27.6" с.ш., 38° 46' 49.2" в.д. Колония занимает площадь примерно 100×80 м в сосняке-зеленомошнике возрастом около 40 лет. Высота сосняка около 20 м. Сосняк от озера отделен стометровой полосой молодого елово-берёзово-осинового леса и следующей за ней стометровой полосой берёзово-ольхового мелколесья с примесью ели, вплотную примыкающей к береговой линии озера.

В 1990-х годах колония размещалась на границе сосняка и смешанного леса на удалении 200 м от берега озера. Из-за сильных ветров

многие гнёзда тогда упали на землю (данные В.Б.Охотина). Начиная с 2009 года колония сместилась в подростный к тому времени сосняк, и в 2013 году, по нашим замерам с помощью GPS-навигатора, наиболее удалённое от берега озера гнездо находилось в 327 м. Число «погибших» гнёзд от сезона к сезону, по-видимому, сокращалось вследствие плавного «перетекания» колонии вглубь прибрежного сосняка. Наряду с этим, по мере роста древостоя в месте расположения колонии в течение последних 20 лет, возрастали и защитные свойства леса.

12 апреля 2013 на гнёздах держались одиночные взрослые цапли или пары, 24 мая там должны были быть птенцы, поскольку под большинством гнездовых построек валялась скорлупа от яиц. Среди битой скорлупы найдены 2 яйца, расклёванных каким-то хищником.

В 2012 году прилёт первых птиц к местам размножения происходил в конце второй декады марта, в 2013 – ранее 12 апреля.

Мы не располагаем материалами по отходу яиц и птенцовой смертности цапель в этой колонии. Однако один из местных жителей, часто посещавший колонию цапель в гнездовой сезон 2012 года, насчитал в ней 27 погибших птенцов разного возраста.

Колония серой цапли в урочище Кухмарь – пока единственное известное место современного размножения вида в котловине озера Плещеево, наиболее удалённое от русла Волги. Эта колония является и самой южной гнездовой группировкой вида в Ярославской области. Рост «плещеевской» гнездящейся популяции серой цапли в течение последних 20 лет согласуется с общим ростом численности гнездящихся серых цапель в центре Верхневолжья.

Белолобый гусь *Anser albifrons*. В 2013 году 27 апреля на восточном побережье озера Плещеево встречена стая из 7 особей, 30 апреля у Блудова болота – из 15 птиц.

Гуменник *Anser fabalis*. 27 апреля 2013 одиночный гуменник наблюдался в полёте на восточном побережье озера Плещеево.

Лебедь-шипун *Cygnus olor*. В 1988-1990 годы неоднократно наблюдался на озере Плещеево в районе урочища Симак одиночно или группами до 3 птиц, но не гнезвился там (Голубев 2011). М.А.Клепиков шипунов на озере видел 30 июня 1991. Вид внесён в 4-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Лебедь-кликун *Cygnus cygnus*. Одиночный взрослый кликун держался на полынье озера Плещеево 11 января 2014 в районе музея-усадьбы «Ботик Петра I». Птица исчезла спустя несколько дней (Е.Горева устн. сообщ.). Вид внесен в 1-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Малый лебедь *Cygnus bewickii*. Две взрослых и одна молодая птицы встречены 15 ноября 1995 в восточной части побережья озера Плещеево (окрестности деревни Криушкино) (Голубев 2011).

Кряква *Anas platyrhynchos*. Обычна на акватории озера Плещеево, по его берегам, устьям и поймам рек и ручьев, по лесным лужам и канавам, заболоченным или обводнённым участкам леса. Гнездится. В 2013 году, начиная с третьей декады мая, среди встреченных птиц преобладали самцы. Они регистрировались 1-10 птицами, крупные скопления не образовывали. 20 августа 2013 у поймы реки Змейка на бобровом водоёме обнаружен выводок из 3 крупных птенцов.

Чирок-свистунок *Anas crecca*. В 2013 году 27 апреля одиночные самцы и пары регулярно вспугивались с лесных водоёмов и канав; на восточном побережье озера Плещеево в окрестностях Синего камня держались группы из 4-5 птиц и стая из 23 особей. Среди встреченных птиц преобладали самцы. Два самца держались 22 мая 2013 в лесу на бобровом водоёме в окрестностях урочища Кухмарь, одиночный свистунок пролетел над озером 23 мая.

Серая утка *Anas strepera*. В июле-августе 1995 года в южной части озера Плещеево держалось около 100 птиц (Голубев 2011). 21 мая 2013 в районе Синего камня отмечен одиночный самец. Вид внесён во 2-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Связь *Anas penelope*. В 2013 году 26-27 апреля и 1 мая пары и небольшие группы наблюдались на заберегах восточного побережья озера Плещеево, 30 апреля 2013 вспугнута пара из заболоченного леса (окрестности Блудова болота).

Шилохвость *Anas acuta*. 1 мая 2013 пара держалась на полынье озера Плещеево в окрестностях устья реки Кухмарка. Вид внесён в 1-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Чирок-трескунок *Anas querquedula*. В 2013 году 26-27 и 30 апреля, 21 мая и 20 августа наблюдался одиночно, парами и небольшими группами по заберегам среди прошлогодней прибрежно-водной растительности (северное, северо-восточное и западное побережья озера Плещеево). Среди встреченных птиц преобладали самцы.

Широконоска *Anas clypeata*. В 2013 году отмечалась на северном и восточном берегах озера 1-4 особями 26-27 апреля, 1-2 и 21 мая. На 12 км по восточному берегу 24 мая отмечены 2 птицы (0.16 ос./км).

Красноголовая чернеть *Aythya ferina*. В 1991-1993 годах одиночные самцы держались в летние месяцы на акватории озера Плещеево. Три самца и стая из 20 особей наблюдались у западного побережья озера 26 апреля 1995.

Хохлатая чернеть *Aythya fuligula*. В 1990-е годы на середине плёса озера Плещеево в летние месяцы отмечались стаи уток, предположительно данного вида (Голубев 2011). 16 ноября 1995 смешанная стая, состоящая из хохлатой чернети и синьги, наблюдалась у восточного побережья озера, а в 2013 году – 1 мая (пара) и 28 июля (2 самца) у северного и северо-восточного берега.

Морская чернеть *Aythya marila*. Пара наблюдалась у западного побережья озера Плещеево 26 апреля 1995 в смешанной стае, состоящей из нескольких видов нырковых уток.

Гоголь *Vincerphala clangula*. Населяет всю акваторию озера Плещеево, обычен. Самка держалась у западного берега озера 1 июля 1991. В 2013 году с 26 апреля по 28 июля гоголь 1-5 птицами встречался как на озере, так и на удалённых от него водоёмах. 26 апреля видели токующую пару. 24 мая по восточному побережью озера численность гоголя составляла 0.08 ос./км маршрута. Выводок пуховичков отмечен 18 июля 1995 недалеко от истока реки Векса. Тогда же на Вексе от истока до озера Сомино обнаружены 3 выводка уже подросших птенцов.

Синьга *Melanitta nigra*. Три особи держались в стае хохлатой чернети у восточного побережья озера Плещеево 16 ноября 1995.

Турпан *Melanitta fusca*. Стая приблизительно из 10 самцов встречена у западного побережья озера Плещеево на мелководьях с отдельными куртинами прибрежно-водной растительности 18 июля 1995.

Длинноносый крохаль *Mergus serrator*. В 1995 году 23-24 мая по паре птиц наблюдали около устья Кухмарки и урочища Симак (восточное и западное побережья озера Плещеево). В окрестностях Синего камня (восточное побережье) 1 мая 2013 года встречена пара.

Большой крохаль *Mergus merganser*. В 1995 году одиночный самец отмечен 27 апреля у западного побережья озера Плещеево в районе урочища Симак. В 2013 году 29 апреля у юго-западного побережья озера (напротив музея-усадьбы «Ботик Петра I») самец и 3 самки сидели на льду у края полыньи. Вид внесён в 1-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Скопа *Pandion haliaetus*. В 1991-1995 годы скопа неоднократно регистрировалась нами в весенне-летний период на озере Плещеево и, возможно, гнездилась в его окрестностях. Однако в последующие годы там обнаружена не была (Голубев 2011). В 2013 году акваторию озера и его окрестности, по нашим наблюдениям, населяла одна или две пары скоп (птицы регистрировались с 26 апреля по 30 июня). В этом году скопы прилетели к местам размножения, скорее всего, в начале третьей декады апреля, когда на озере появились забереги и полыньи (до 16 апреля скопы на озере отсутствовали). Птицы держались на относительно мелководных участках. До освобождения озера ото льда скопы охотились преимущественно в его северной части (устье Кухмарки и её окрестности). По мере разрушения ледового покрова озера охотничий участок скопы увеличивался, охватив почти все восточное побережье к югу вплоть до Переславля-Залесского. Западное побережье в качестве места охоты птицами не использовалось. С рыбой скопы улетали в северо-западном или в северо-северо-западном направлении, где у них, возможно, было гнездо (или гнёзда). Гнездовой участок скоп, вероятно,

находился в заболоченном лесном массиве к северу от северного берега озера и к востоку от села Купанское. На озеро птицы прилетали только с севера. Успешную поимку рыбы скопами мы наблюдали неоднократно. В одном случае (26 апреля 2013) скопа поймала щуку весом до 1 кг. Сроки отлёта скопы не прослежены, но, посещая озеро 19 августа 2013, а также в последующие дни, скопу встретить не удалось.

Высокая рекреационная нагрузка на экосистему озера Плещеево в летние месяцы не оказала влияния на пребывание скопы здесь в гнездовой период. В ходе обследования территории мы неоднократно отмечали одиночных птиц, кружащих над Дендросадом имени С.Ф.Харитоновна или непосредственно над селитебным сектором Переславля-Залесского. Во время охоты скопы терпимо относились и к множеству присутствующих на побережье отдыхающих. По-видимому, сохранение гнездовых стаций скопы и достаточное количество доступных пищевых ресурсов озера позволили ей успешно пребывать на данной территории в течение всего текущего гнездового сезона. Полученный в 2013 году материал свидетельствует о том, что озеро Плещеево и его окрестности, вероятно, служат одним из немногих мест нерегулярного пребывания, а, возможно, и гнездования скопы на юге Ярославской области. Ближайшие известные места гнездования вида в Переславском районе – Батьковское болото и верховое болото северо-восточнее города Кубринск, где в конце XX и начале XIX столетий находили жилые гнёзда этих птиц (Волков и др. 1998; ПмиП 2005). Для привлечения скоп на территорию НП «Плещеево озеро» и увеличения их численности следует делать искусственные гнездовые платформы. В качестве наиболее перспективных мест для их размещения, по нашему мнению, следует указать на лесные массивы к северу и западу от озера. Вид внесён в 1-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Осоед *Pernis apivorus*. В 1995 году осоед неоднократно отмечался в пойме реки Векса и у села Купанское в гнездовой период. Встречен на пролёте в 2013 году между стационаром Кухмарь и селом Купанское 13 и 16 апреля – мигрировал парно или одиночно. В гнездовой период 2013 года (21 мая и 28-29 июля) в лесном массиве севернее озера Плещеево регулярно отмечалась, видимо, местная пара и одиночные птицы. 26 мая в пойме реки Трубеж у окраины Переславля-Залесского одиночный осоед летел в западном направлении. 20 августа в окрестностях Блудова болота обнаружены 2 летающих слётка осоеда. Вид внесён во 2-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Чёрный коршун *Milvus migrans*. В 2013 году котловину озера Плещеево населяла одна пара коршунов. Первая встреча одиночной птицы в 2013 году зарегистрирована 12 апреля у колонии серых цапель (пионерский лагерь Сосновый, урочище Кухмарь). В дальнейшем пара коршунов, несомненно, гнездилась в окрестностях этой колонии,

на что указывало поведение птиц и траектории их кормовых перелётов. Их охотничий участок охватывал почти все береговые станции озера, но в поиске корма коршуны отдавали предпочтение восточному и северо-восточному побережью, особенно окрестностям устья Кухмарки. Последняя регистрация одиночной взрослой птицы – 28 июля 2013.

Полевой лунь *Circus cyaneus*. 22 июня 1995 пару видели на прибрежных лугах озера Плещеево у дереревни Криушкино. 26 мая 2013 самец охотился на лугу в пойме реки Трубеж у южной окраины Переславля-Залесского. Вид внесён в 3-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Луговой лунь *Circus pygargus*. 23 мая 2013 самка лугового луня вспугнута с участка ветровала в пойме реки Змейка. Вид внесён в 3-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Болотный лунь *Circus aeruginosus*. 2 мая 2013 в урочище Кухмарь на значительной высоте парил молодой самец болотного луня в неполном брачном наряде, 29 июля наблюдали самку в заболоченной местности севернее озера Плещеево.

Тетеревятник *Accipiter gentilis*. Редок. 15 апреля 2013 самца подняли из куртины ивняка в окрестностях Синего камня.

Перепелятник *Accipiter nisus*. Обычный, но немногочисленный гнездящийся вид. В 2013 году окрестности котловины озера Плещеево населяли 1-2 пары; 26 апреля 2013 на окраине Дендросада имени С.Ф.Харитоновна в густом молодом сосняке держалась пара перепелятников с явными признаками территориального беспокойства; там же обнаружены 2 вороньих гнезда, в одном из которых ястребы, несомненно, гнездились; при посещении Дендросада 25 мая перепелятники продолжали держаться в нём. В этом же году 27 апреля, 19 и 21 августа в окрестностях озера Плещеево нами неоднократно регистрировались одиночные птицы в урочище Кухмарь, на окраине Блудова болота и в деревне Соломидино.

Зимняк *Buteo lagopus*. 16 ноября 1995 три пролётных зимняка мигрировали на значительной высоте севернее озера Плещеево.

Канюк *Buteo buteo*. Немногочисленный, вероятно гнездящийся вид. В 2013 году на весеннем пролёте наблюдался 11–16 апреля, причём с 16 апреля на гнездовых участках стали регистрироваться местные птицы. 19-20 августа наблюдались, видимо, кочующие особи.

Подорлик *Aquila* sp. 14 апреля 2013 одиночный подорлик, не определённый до вида, летел в восточном направлении (окрестности села Городище).

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. В 1990-х годах в окрестностях озера Плещеево орлан не гнезвился (Голубев 2011). В последующее время на территории НП «Плещеево озеро» гнёзд обнаружено не было. В 2013 году орлан-белохвост встречен на весеннем пролёте 1 мая

на отрезке между урочищем Кухмарь и селом Купанское – 2 особи во взрослом наряде летели на высоте около 100 м в северо-северо-западном направлении. Дистанция между птицами не превышала 50 м. Вид внесён в 1-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Чеглок *Falco subbuteo*. Обычный гнездящийся вид. В начале 1990-х годов регулярно наблюдался в гнездовой период в урочище Симак. В 1992 году 2 июня в молодом сосняке на западном побережье озера Плещеево обнаружено гнездо чеглока с кладкой из 3 сильно насиженных яиц, в котором шло вылупление одного птенца (Голубев 2011). В 2013 году чеглок наблюдался на протяжении всего гнездового периода (с 26 апреля по 28 июля) на побережье озера Плещеево. По беспокойному поведению пар на гнездовых участках и встречах птиц, несущих в лапах добычу, нами выявлены две гнездовые территории – одна на окраине Переславля-Залесского у воинской части (южный берег озера), другая – в «кухмарском» сосняке (северное побережье озера). С учётом регистраций чеглоков в ряде мест побережья, кроме указанных выше, котловину озера могут населять 3-4 пары.

Дербник *Falco columbarius*. 19 августа 2013 на западном побережье озера Плещеево у реки Язевка держалась пара, проявлявшая беспокойство.

Кобчик *Falco vespertinus*. Беспокоящаяся пара кобчиков наблюдалась 28 июля 2013 у Криюшкинской рощи (северо-восточное побережье озера Плещеево). Вид внесен в 1-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Обыкновенная пустельга *Falco tinnunculus*. Одиночная птица отмечена на западном берегу озера Плещеево в районе урочища Симак 27 апреля 1995. Нетерриториальная пара сидела на старой древовидной иве среди пойменного луга реки Трубеж 26 мая 2013.

Тетерев *Lyrurus tetrix*. Встречи взрослых птиц, наличие действующих токов, находки перьев молодых тетеревов, кем-то пойманных и съеденных, и зимнего помёта свидетельствуют о том, что тетерев в окрестностях озера Плещеево – немногочисленный широко распространённый и круглогодично встречающийся вид птиц. В 2013 году 13-16 апреля примерно в 300 м от точки с координатами 56°49' 54.4" с.ш., 38°43'58.4" в.д. (окрестности источника «Варварин ключ») выявлен тетеревиный ток, состоящий из двух или более токующих самцов; 30 апреля по голосам токующих самцов обнаружен другой ток на Блудовом болоте, но точное число токовилов не установлено. Наиболее поздняя дата токования – 21 августа 2013 (одионый косач у деревни Соломидино).

Глухарь *Tetrao urogallus*. Обычный, широко распространённый в соответствующих местообитаниях, круглогодично встречающийся вид птиц НП «Плещеево озеро». Сохранение гнездящейся популяции вида

при ежегодно возрастающем рекреационном прессе на данную территорию оказалось возможным благодаря охране его местообитаний. На территории НП «Плещеево озеро» существуют несколько глухариных токов в заболоченных лесных массивах к северу и к западу от побережья озера, где глухарь наиболее обычен. В северном, северо-западном и западном секторах побережья нам неоднократно встречались взрослые птицы, выводки, помёт и перья глухарей. На остальной территории НП глухарь не встречается ввиду отсутствия подходящих для него местообитаний. Согласно данным опроса В.Б.Охотина, «северных» токов всего два. Сведениями о состоянии токов к западу от озера мы не располагаем. Первый глухариный ток расположен в квартале № 2 на границе с Бармазовским охотхозяйством. В 2001 году на нём отмечено 6 токующих самцов. В последние годы токует 1-2 самца. Биотоп: елово-лиственный лес, граничащий с небольшим заболоченным сосняком. Ток расположен недалеко от действующих подкормочных площадок кабанов, на которых может собираться до 6-8 и более зверей одновременно. Второй глухариный ток расположен в квартале № 12, в урочище «Мося». В 2000 году на току собиралось 4-5 самцов, в настоящее время – 1-2 самца. Биотоп: сосново-елово-берёзовый лес. 29 июля 2013 у поймы реки Векса встречен выводок глухаря, состоявший из 6 птенцов размером в половину взрослых. 19 августа 2013 у реки Язевка вспугнут молодой самец, рулевые перья которого находились в стадии линьки. Неуклонное снижение численности глухаря в последние два десятилетия, скорее всего, происходит из-за роста численности на территории НП кабана, для которого сооружены подкормочные площадки и на регулярной основе производится подкормка. Отдельные подкормочные площадки расположены в относительной близости от функционирующих глухариных токов.

Рябчик *Tetrastes bonasia*. Обычный, широко распространённый в соответствующих местообитаниях, круглогодично встречающийся вид. Предпочитаемые местообитания рябчика – сильно заболоченные участки елово-сосново-лиственных лесов, местами с тростником, затопленные ивово-ольховые редколесья с елью, заболоченные смешанные леса. Наиболее высокая плотность населения рябчика зафиксирована в лесных массивах к западу, северо-западу и северу от побережья озера Плещеево (пойменные леса реки Векса, окрестности Блудова болота, урочища Кухмарь и Симак). Поддержание гнездящейся популяции рябчика при ежегодно возрастающем рекреационном прессе на данную территорию возможно благодаря сохранению местообитаний этого вида. Популяция, по-видимому, стабильна. 29 июля 2013 у поймы реки Векса встречен выводок рябчика, состоящий из 3 птенцов.

Серая куропатка *Perdix perdix*. По-видимому, регулярно и круглогодично населяет луго-полевые станции восточного побережья озера

Плещеево. В конце 1990-х годов стайки серых куропаток неоднократно регистрировались в окрестностях села Городище (Ю.В.Кодухова, устн. сообщ.), в 2013 году там же эти птицы отмечены дважды: зимой – стайка из 9 птиц; в марте – 2 особи (данные опроса В.Б.Охотина). Вид внесен в 5-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Перепел *Coturnix coturnix*. 22 июня 1995 «бой» самца зарегистрирован у села Никитская Слобода. 25 июля 2012 перепел токовал возле села Городище (В.А.Симонов, устн. сообщ.). 26 мая 2013 в пойменных лугах реки Трубеж учтены 3 токующих самца на 8 км маршрута (0.37 особи на 1 км).

Серый журавль *Grus grus*. На территории НП не гнездится и не образует предотлётных скоплений. Встречается во время пролёта и кочёвок. 26 апреля 2013 над устьем Кухмарки наблюдались 7 птиц, 23 мая 2013 одиночная особь пролетела над селом Купанское. Направление полёта северное. Вид внесён во 2-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Погоныш *Porzana porzana*. 1-4 июля 1991 в зарослях прибрежно-водной растительности (осоки, тростника и камыша) на западном берегу озера Плещеево погоныш был обычен. Свист токующих самцов слышался на протяжении всех ночей и в утренние часы. В 1995-1996 годы крики самцов регулярно доносились из прибрежной растительности вдоль восточного берега озера. 26 апреля 1995 крик 3 самцов зарегистрирован на краю Блудова болота.

Коростель *Crex crex*. Обычный, но немногочисленный вид побережья озера Плещеево. Населяет пойменные луга с кустарником. В начале 1990-х годов был обычен, местами многочислен по прибрежным стациям. К настоящему времени заметные изменения в распространении и численности коростеля не выявлены. По западному берегу озера он регистрируется от деревни Новоселье до окраины Переславля-Залесского, по восточному – от окрестностей устья Кухмарки до окрестностей села Никитская Слобода. Участок высокой плотности токующих самцов выявлен на побережье озера южнее устья Кухмарки. Крики отдельных птиц отмечались на полянах лесного массива урочища Кухмарь.

Галстучник *Charadrius hiaticula*. 15 апреля 2013 одиночный галстучник пролетел в восточном направлении южнее села Городище.

Чибис *Vanellus vanellus*. Обычный, но немногочисленный вид. Населяет влажные пойменные луга с наличием редкого кустарника, поля, пустоши. В котловине озера Плещеево встречается по его юго-западному и восточному побережьям. Территориальные пары наблюдались у границ Переславля-Залесского. На весеннем пролёте регистрировался 14-16 апреля 2013. Мигрировал 1-3 особями. Направление миграций восточное и северо-восточное. В местах гнездования чи-

бис обычно не образует плотных скоплений, и пара от пары селится на значительном удалении. Наиболее крупное гнездовое поселение чибисов, состоящее из 8 пар, вместе с гнездящимися травниками, выявлено 24 мая 2013 южнее устья Кухмарки. В других подходящих для гнездования местах чибис держался 1-3 парами (устье Кухмарки, окрестности Никитской Слободы и др.). 28 июля 2013 у Криушкинской рощи наблюдался взрослый чибис с признаками беспокойства. 12 июня 1995 пуховой птенец чибиса обнаружен на лугу у села Никитская Слобода.

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus*. В июле 2003 года одиночный кулик-сорока держался на искусственном песчаном пляже Переславля-Залесского (южный берег озера Плещеево). 29 апреля 2013 у музея-усадьбы «Ботик Петра I» видели летящего одиночного кулика. Вид внесён во 2-ю категорию Красной книги Ярославской области. Недавние встречи кулика-сороки в гнездовой период и находка гнезда этого вида в северном Подмоскowie позволили Т.В.Свиридовой и О.С.Гринченко (2012) сделать предположение о самом начале расселения материкового подвида кулика-сороки *H. o. longipes* не только в северном Подмоскowie, но и в Верхневолжье в пределах Ярославской и Тверской областей.

Черныш *Tringa ochropus*. Обычный, но немногочисленный вид. Встречается повсеместно по побережью озера Плещеево и прилегающим ландшафтам. Чаще регистрируется по западному, облесенному берегу. В 2013 году беспокоящиеся пары наблюдались 27 и 30 апреля (окрестности истока Вексы и Блудова болота, соответственно). Гнездовые станции: заболоченные леса побережья озера.

Фифи *Tringa glareola*. Одиночная птица держалась на западном берегу озера Плещеево 26 апреля 1995. Вид внесён в 3-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Большой улит *Tringa nebularia*. Редкий пролётный вид. 14 апреля 2013 голос одиночной птицы слышали в окрестностях села Городище. Она мигрировала в восточном направлении. 27 апреля 2013 около устья Кухмарки две одиночки летели вдоль береговой линии озера.

Травник *Tringa totanus*. Малочисленный, спорадично распространённый, гнездящийся вид побережья озера Плещеево. В 1995 году в юго-восточной части побережья озера на сравнительно небольшом низкотравном слабопологом сыром лугу было выявлено гнездовое поселение травников, состоящее из 8-10 пар (Голубев 2011). Впоследствии возросшая рекреационная нагрузка в данном месте в гнездовой период привела к исчезновению этих птиц. Наряду с этим, в 1995 году отдельные пары и небольшие гнездовые колонии (2-4 пары) были выявлены в устье Кухмарки, а также на южном и на западном берегах озера Плещеево. 27 апреля 2013 на прибрежном участке луга около устья Кухмарки (охраняемая территория, свободная от рекреации)

держалось несколько травников. Позднее, 24 мая 2013 в этом месте обнаружено их гнездовое поселение, состоящее из 3 пар. Птицы выбрали сырой разнотравный прибрежный участок луга, непосредственно примыкающий к берегу озера. Все три пары проявляли сильное беспокойство. У одной обнаружен птенец в возрасте более 2 дней, который в присутствии человека скрылся вплавь в прибрежном тростнике озера. Координаты места встречи птенца травника: 56°47'50.8" с.ш., 38°48'04.1" в.д. Таким образом, травник сохранился в качестве гнездящегося вида на побережье озера лишь на охраняемом участке, не затронутом рекреацией (окрестности устья реки Кухмарка).

Щёголь *Tringa erythropus*. Три самца отмечены в стае с 15 травниками 23 июня 1995 на южном берегу озера Плещеево недалеко от границы Переславля-Залесского.

Перевозчик *Actitis hypoleucos*. Отмечен на западном берегу озера Плещеево 26 апреля 1995. Одиночка держался на берегу озера в районе села Никитская Слобода 1 мая 2013.

Мородунка *Xenus cinereus*. Одиночная мородунка отмечена на западном берегу озера в районе устья реки Куротень 23 июня 1995. Вид внесен в 4-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Турухтан *Philomachus pugnax*. Три самца в брачном наряде обнаружены 22 июня 1995 на прибрежном лугу у деревни Криушкино. Две особи отмечены 23 июня 1995 на южном берегу озера Плещеево недалеко от границы Переславля-Залесского. Единичные пролётные турухтаны встречены 17 июля 1995 на западном берегу озера Плещеево.

Кулик-воробей *Calidris minuta*. Немногочисленный пролётный вид. 1-3 особи наблюдались на юго-западном и западном берегу озера Плещеево 17 июля 1995.

Чернозобик *Calidris alpina*. Одиночная особь держалась на юго-западном побережье озера Плещеево 17 июля 1995.

Бекас *Gallinago gallinago*. Обычный, местами многочисленный вид. В гнездовой период населяет разнообразные станции – болота, заболоченные окраины леса, редколесья, заболоченные леса с сухими сосновыми гривами, побережья водоёмов. В 2013 году 27 апреля в окрестностях истока Вексы в заболоченных тростниковых зарослях и затопленном ивово-ольховом редколесье, граничащем с заболоченным смешанным лесом, зарегистрирована высокая численность бекасов, активно токующих группами или одиночно. 30 апреля бекас был обычен на Блудовом болоте и по его окраинам; 21 мая встречался на северном побережье озера Плещеево. Гнездо с кладкой обнаружено на прибрежном лугу западного берега озера Плещеево 23 июня 1995.

Дупель *Gallinago media*. Редок. В 1995 году в гнездовой период одиночные птицы зарегистрированы на побережье озера Плещеево в районе урочища Кухмарь и на заболоченных, подтопленных берегах

поймы Вексы. 21 мая 2013 одиночка держался в устье реки Кухмарка. Вид внесен в 3-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Вальдшнеп *Scolopax rusticola*. Немногочисленный вид. В 2013 году 14 апреля на окраине Криушкинской рощи собакой вспугнута одиночная особь (первая встреча в 2013 году); 16 апреля по обочинам лесных дорог северной части побережья озера Плещеево вспугивались пары, но птицы не токовали; 28 апреля тяга вальдшнепов отмечена в смешанном лесу у урочища Кухмарь; 23 мая у границы Переславля-Залесского (юго-восточное побережье озера Плещеево) вечером «протянул» один самец. В конце июня – начале июля 1991 года мы наблюдали окончание тяги вальдшнепа в средневозрастном сосняке с примесью лиственных видов деревьев, примыкавшем к побережью озера Плещеево (западное побережье); до 2 июля на вечерней тяге регистрировались 4 токующих птицы; на утренней тяге 3 июля протянул одиночка. В последующие дни на тяге отмечались только «цвиркающие» птицы, а на вечерней тяге визуально отмечены 3 особи (Голубев 2011).

Большой кроншнеп *Numenius arquata*. Над пойменными лугами реки Трубеж 26 мая 2013 в восточном направлении пролетела пара. Вид внесён во 2-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Большой веретенник *Limosa limosa*. В 2013 году 30 апреля на западном берегу озера Плещеево отмечен одиночный мигрирующий веретенник, 2 мая на северном берегу озера кормилась пара. Вид внесён в 3-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Малая чайка *Larus minutus*. В 1995 году в гнездовой период малая чайка неоднократно отмечалась на акватории озера Плещеево, но не гнездилась на нём.

Озёрная чайка *Larus ridibundus*. Обычный, широко распространённый гнездящийся вид. В 2013 году 13 апреля отмечены первые пролётные птицы. К 16 апреля первая волна пролёта затухла. Направление пролёта восточное. 26 апреля 2013 одиночки, возможно уже местные, летали вдоль береговой кромки озера. В третьей декаде мая в котловине озера Плещеево озёрная чайка была более обычна, чем сизая. Небольшие скопления кормящихся озёрных чаек отмечались на полях, лугах или на прудах у населённых пунктов. Ночью чайки интенсивно охотились на майских хрущей. 24 мая 1995 колония озёрной чайки из 20-40 гнёзд обнаружена на южном берегу озера Плещеево на границе Переславля-Залесского. Колония располагалась на заливе, сильно заросшем рогозом и осокой. В 2013 году колонии в данном месте не было. Ещё одна колония обнаружена 21 июня 1995 и повторно осмотрена 26 мая 2013. Она расположена в пойме реки Трубеж на окраине Переславля-Залесского, в окрестностях деревни Грачковская Слобода (130 м н.у.м.). Координаты места размещения колонии: 56°44' 05.8" с.ш., 38°52'22.6" в.д. Колония расположена компактно на низин-

ном болоте, заросшем камышом, рогозом и тростником. В 1995 году в колонии было около 200 гнёзд. По приблизительным оценкам, общая численность птиц в этой же колонии в 2013 году – 250-300 пар; большинство чаек сидело на кладках, а на периферии колонии найдены отдельные яйца, расклёванные какими-то хищниками. Пока это самая южная из известных нам колоний озёрных чаек в Ярославской области. Напомним также, что в 1930-х годах на Переславщине озёрная чайка считалась весьма обычным пролётным, гнездящимся и летующим видом птиц (Птушенко, Гладков 1933).

Серебристая чайка *Larus argentatus*. Малочисленный пролётный, вероятно летующий вид. 15 апреля 2013 одиночная серебристая чайка в окончательном наряде мигрировала на юг (восточный берег озера Плещеево). 1-2 мая 2013, скорее всего, одна и та же неполовозрелая двухлетняя птица держалась в группе озёрных чаек у Синего камня. 21 мая 2013 у устья Кухмарки держалась одиночная серебристая чайка, затем ещё 2 особи встречены в полёте. Вид внесён в 3-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Сизая чайка *Larus canus*. Обычный, повсеместно распространённый, летующий и мигрирующий вид. Гнездование не доказано, но возможно. В 2013 году на весенних миграциях встречалась с 14 по 27 апреля. Направление миграций юго-восточное. К концу третьей декады апреля регулярно регистрировались, видимо, местные птицы, летавшие вдоль границы льда по побережью озера.

Чёрная крачка *Chlidonias niger*. Малочисленный летующий и гнездящийся вид. В 1995 году крачки гнездились у северо-западного побережья озера Плещеево в числе 5 пар (Голубев 2011). На южном берегу озера на границе с Переславлем-Залесским 24 мая 1995 была обнаружена ещё одна колония, состоящая из 8 гнездящихся пар. В этой колонии все гнёзда были плавающими, располагаясь среди осоки. Глубина в местах расположения гнёзд составляла 0.5 м. В одном осмотренном гнезде находилось 1 яйцо. При осмотре той же колонии 17 июля 1995 в гнёздах были пуховые птенцы. Вероятно, по неизвестной нам причине, первые кладки погибли. 21 мая 2013 у устья реки Кухмарка чёрные крачки встречались 1-2 особями.

Белокрылая крачка *Chlidonias leucopterus*. В 1994-1995 годах в южной и северо-западной частях озера Плещеево допускалось гнездование 1-3 пар белокрылых крачек (Голубев 2004; Голубев 2011). Вид внесён в 3-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Речная крачка *Sterna hirundo*. Малочисленный летующий вид. В июле 1991-1992 годов речная крачка была малочисленна на западном побережье озера Плещеево. 21 мая 2013 вдоль восточного побережья озера встречались одиночные особи.

Малая крачка *Sterna albifrons*. В июле 2003 года одиночная ма-

лая крачка пролетела над искусственным песчаным пляжем Переславля-Залесского (южный берег озера Плещеево). Вид внесён во 2-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Вяхирь *Columba palumbus*. Малочисленный пролётный вид. В 2013 году на весеннем пролёте регистрировался в период с 11 по 30 апреля 1-4 особями. Направление пролёта восточное. 2 мая 2013 пара вяхирей отмечена на кабаньей подкормочной площадке в урочище Кухмарь. Токующие птицы и гнёзда вяхиря обнаружены не были.

Сизый голубь *Columba livia*. Обычный гнездящийся вид Переславля-Залесского. В 2013 году с 11 апреля неоднократно отмечался в Переславле-Залесском со строительным материалом в клюве. За пределами Переславля-Залесского встречался на кормовых перелётах стаями, не превышавшими 25 птиц.

Обыкновенная горлица *Streptopelia turtur*. 28 июля 2013 молодая горлица кормилась на обочине дороги в окрестностях устья реки Кухмарка.

Кукушка *Cuculus canorus*. Обычный немногочисленный, без сомнения, размножающийся вид прибрежных ландшафтов озера Плещеево. В 1991 году в урочище Симак нерегулярное кукование самцов регистрировалось в первой декаде июля. Первое кукование самца в 2013 году зарегистрировано 27 апреля в прибрежных лесах северной части побережья озера. 20 августа 2013 на западном его берегу в точке с координатами 56°46' с.ш., 38°39' в.д. наблюдалась молодая кукушка.

Ушастая сова *Asio otus*. Обычный гнездящийся и пролётный вид. 1-4 июля 1991 в разреженном высокоствольном сосняке (урочище Симак) обнаружен выводок, состоящий не менее чем из 3 птенцов. Птенцы постоянно подавали голос, взрослые кормили их. В 1995 году ушастая сова гнездилась в районе деревни Криушкино в старом сорочьем гнезде, расположенном в 3 м от земли. 23 мая в этом гнезде находились 2 птенца, голос ещё одного птенца был слышен недалеко от гнезда. Токующие самцы отмечались 30 апреля 2004 и 1 мая 2005 в урочище Кухмарь.

Болотная сова *Asio flammeus*. 26 мая 2013 одиночная птица охотилась днём на участке пойменного луга реки Трубезж у окраины Переславля-Залесского. Вид внесён во 2-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Серая неясыть *Strix aluco*. В 1994-1995 годах крики серых неясытей неоднократно отмечались во второй половине лета и осенью в урочище Кухмарь. В 2003 году в урочище Кухмарь 31 июля на протяжении 6 км маршрута было обнаружено 3 вывода.

Длиннохвостая неясыть *Strix uralensis*. Летом 2009 года в 26-м квартале в 1 км от святого источника Варвары Великомученицы В.Б. Охотиным обнаружены 4 птенца неясыти, которых кормила взрослая

птица. Птенцы были лётными, размеры их сопоставимы с взрослыми птицами.

Козодой *Caprimulgus europaeus*. 19 августа 2013 на окраине Блудова болота ночью отмечен крик одиночной птицы.

Чёрный стриж *Apus apus*. Немногочисленный гнездящийся вид Переславля-Залесского. Отмечался в гнездовой период 2013 года в селе Вёськово.

Удод *Uria eops*. 23 июня 1995 одиночный удод отмечен в березняке на западном берегу озера Плещеево. 2 мая 2004 токующая особь держалась в смешанном лесу урочища Кухмарь.

Вертишейка *Jynx torquilla*. Малочисленный, возможно гнездящийся вид. В 2013 году одиночные птицы регистрировались нами в лесах и перелесках северной и северо-восточной части побережья озера Плещеево в период с 14 апреля по 21 мая. Населяет елово-сосновые леса с дубом, ольхой и берёзой, дубово-липово-ольховые леса, ольхово-берёзовое мелколесье.

Зелёный дятел *Picus viridis*. В 1995 году 26 апреля встречен на западном побережье озера Плещеево в урочище Симак. Вид внесён во 2-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Седой дятел *Picus canus*. Одиночная птица встречена в смешанно-широколиственном лесу у северного побережья озера Плещеево 21 мая 2013. Внесён во 2-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Желна *Dryocopus martius*. Обычный, но немногочисленный вид. Населяет лесные массивы, расположенные западнее, северо-западнее и севернее от побережья озера Плещеево. Встречается одиночно или парами в лесах разных типов. Единичные встречи с чёрными дятлами происходили в населённых пунктах и на их окраинах. В 2013 году барабанная дробь желны отмечалась нами с 13 апреля по 2 мая. В Заладьевском лесничестве в смешанном лесу в стволе одной из усыхающих сосен обнаружено нежилое дупло желны. Леса, окружающие побережье озера Плещеево могут населять не менее 3 пар этих дятлов.

Большой пёстрый дятел *Dendrocopos major*. Обычный широко распространённый гнездящийся вид, встречающийся круглогодично. Самый многочисленный из дятлов на территории НП «Озеро Плещеево». Населяет леса разных типов: хвойные, смешанные; встречается в чисто лиственных (например, черно- и сероольшаниках), по прибрежным пустошам с сильно разреженным молодым древостоем. Обитает в населённых пунктах с наличием на их территориях сосновых боров. Обычен он в прибрежных лесах котловины озера Плещеево на западе, северо-западе и севере. На восточном побережье может быть встречен только в Криушкинской роще и на прибрежных пустошах. Зафиксирован он и непосредственно в Переславле-Залесском – в Дендросаду имени С.Ф.Харитонов. Барабанные дробы больших пёстрых дятлов

мы отмечали 13-16 апреля 2013. В национальном парке нами многократно обнаруживались действующие кузницы и нежилые дупла этого вида. Жилое дупло обнаружено в урочище Симак. Оно находилось под нашим наблюдением 1-4 июля 1991, располагалось на сосне на высоте 3 м от земли на окраине соснового леса с развитым подлеском. В дупле были птенцы, готовые покинуть его со дня на день.

Белоспинный дятел *Dendrocopos leucotos*. Малочисленный вид. Населяет смешанные и лиственные леса, часто захламлинные и заболоченные. Встречается в пойменных лугах с редким древостоем. В 2013 году в период с 13 апреля по 26 мая зарегистрированы 4 одиночные птицы на севере и востоке побережья озера Плещеево, пара встречена в пойме реки Трубеж.

Малый пёстрый дятел *Dendrocopos minor*. Немногочисленный, предположительно гнездящийся, широко распространённый вид. Населяет как сухие, так и заболоченные хвойные (сосняки), смешанные и лиственные леса. Придерживается окраин, опушек, просек и обочин лесных дорог с кустарником. Встречается в ближайших окрестностях населённых пунктов. Большинство встреч с малым пёстрым дятлом (7 встреч одиночных птиц) произошло в лесах к северу и западу от побережья озера Плещеево. Первый весенний крик в 2013 году зафиксирован 11 апреля, а с 16 апреля брачные крики и барабанные дробы слышались чаще. Наиболее поздний крик этих птиц отмечен 29 июля.

Трёхпалый дятел *Picoides tridactylus*. Редкий, спорадично распространённый вид. 28 июля 2013 в смешанном лесу у северного побережья озера (свёртка на деревню Студенец) наблюдалась самка, кормящаяся на осине. 20 августа 2013 на западном берегу у реки Язевка держался одиночка. Вид внесён в 3-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Береговая ласточка *Riparia riparia*. На территории НП «Плещеево озеро» колонии береговушек не обнаружены. 28 июля 2013 в устье Кухмарки наблюдались стайки этих птиц. 30 июля 2013 на восточном берегу озера Плещеево держалась стая из нескольких сотен особей. Скопления береговушек в тот день отмечены и в районе истока Вексы.

Деревенская ласточка *Hirundo rustica*. Немногочисленный гнездящийся вид. Гнездится в населённых пунктах сельского типа. Кормится в открытых стациях. 27 апреля 2013 группа из 4 птиц наблюдалась на берегу озера в устье Кухмарки (первая встреча в 2013 году). Наиболее поздняя встреча – 21 августа 2013 (деревня Соломидино).

Воронок *Delichon urbica*. Немногочисленный гнездящийся вид. В начале 1990-х годов гнезвился в Переславле-Залесском. Наблюдался 21 августа 2013 в деревне Соломидино.

Полевой жаворонок *Alauda arvensis*. В 2013 году пролёт наблюдали с 14 апреля по 1 мая. Направление пролёта юго-восточное. Летят

одиночно или группами до 3 птиц. На проталинах среди заснеженных лугов восточного побережья озера полевые жаворонки иногда останавливаются на отдых и кормление.

Лесной конёк *Anthus trivialis*. Обычен на пролёте и в местах размножения. На весенних миграциях в 2013 году регистрировался 14-16 апреля 1-3 особями. Направление пролёта восточное. 27 апреля 2013 наблюдались отдельные самцы, пытавшиеся петь в прибрежных кустах озера Плещеево. 29 апреля территориальные самцы уже исполняли полноценные варианты песен.

Луговой конёк *Anthus pratensis*. Малочислен на пролёте и в местах размножения. Населяет заболоченные участки побережья озера Плещеево. В 2013 году на весенних миграциях регистрировался 14-15 апреля 1-2 особями. Направление пролёта восточное. 27 апреля, 1 и 21 мая 2013 наблюдались одиночные поющие самцы (устье Кухмарки, окрестности Синего камня и села Никитская Слобода). Луговой конёк внесён в 3-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Жёлтая трясогузка *Motacilla flava*. В начале 1990-х годов редкие одиночки встречались летом южнее урочища Симаки. В 2013 году жёлтая трясогузка наблюдалась в числе 1-5 птиц 27 апреля, 1 и 21 мая на побережье озера Плещеево вдоль уреза воды среди полузатопленной растительности (окрестности устья Кухмарки). Среди встреченных особей преобладали самцы.

Желтоголовая трясогузка *Motacilla citreola*. В 2013 году 27 апреля самец держался на лугу в районе Синего камня. На восточном побережье озера 1 мая встречены пара и одиночка. 26 мая в пойменных лугах реки Трубеж на 8 км маршрута зарегистрированы 2 самца (0.25 ос./км).

Белая трясогузка *Motacilla alba*. Обычный пролётный и гнездящийся вид, широко распространённый на территории национального парка. Населяет разнообразные типы местообитаний, в том числе и населённые пункты. Наиболее высокая плотность населения вида зарегистрирована в начале гнездового периода в открытых прибрежных стациях северо-восточного побережья озера Плещеево (от кемпингов до устья Кухмарки). Жилые гнёзда ($n = 3$) обнаружены нами в населённых пунктах (действующих и заброшенных). В 2013 году 11-17 апреля были выражены миграции белых трясогузок. Птицы летели одиночно, небольшими группами и стаями до 13 особей. Направление миграций южное, юго-восточное и восточное. В Переславле-Залесском 11 апреля белые трясогузки уже были местными, территориальными.

Обыкновенный жулан *Lanius collurio*. 2 июля 1992 самец встречен на лугу с ивняком в окрестностях деревни Веслево. 2 мая 2013 в устье Кухмарки отмечен одиночный самец, а 21 мая на восточном побережье озера Плещеево держались 3 территориальных самца, север-

нее озера Плещеево отмечен 1 территориальный самец. 27 июля 2009 слётков, сбитый машиной, обнаружен недалеко от села Городище.

Серый сорокопут *Lanius excubitor*. Одиночная особь пролетела над пустошью 14 апреля 2013 в восточном направлении (окрестности села Городище). Вид внесён в 1-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Иволга *Oriolus oriolus*. Немногочисленный вид лесов НП «Плещеево озеро». Населяет лиственные, хвойно-мелколиственные и хвойно-широколиственные леса. При обследовании прибрежных лесов озера в 2013 году 21 и 23 мая иволга была обнаружена повсеместно на обследуемой территории, но пара от пары селилась на расстоянии, превышавшем 1 км. 20 августа 2013 у реки Язевка (западное побережье) встречена молодая особь. 25 мая 2013 в течение дня иволга неоднократно наблюдалась в Переславле-Залесском на территории Дендросада имени С.Ф.Харитоновна.

Скворец *Sturnus vulgaris*. Обычный гнездящийся вид населённых пунктов. В Переславле-Залесском гнездится в скворечниках, вывешенных в районе частной застройки, в парках и скверах. Возможно, скворцы гнездятся в Дендросаду. В 2013 году 14-15 апреля наблюдались две пролётные стайки из 5 и 6 птиц соответственно, мигрировавших вдоль восточного берега озера Плещеево. Направление пролёта южное. 25 мая 2013 в Переславле-Залесском обнаружены два жилых дупла скворцов в вязах на высоте 0.9 и 1.7 м от земли. Родители выкармливали птенцов майскими хрущами, гусеницами, бабочками и двукрылыми. Стайки скворцов, собиравших корм, отмечались на побережье озера у деревни Криушкино 21 мая 2013.

Сойка *Garrulus glandarius*. Обычный, но немногочисленный вид. Встречается круглогодично. Населяет почти все типы лесов, окружающих котловину озера Плещеево. В урочище Симак 1-4 июля 1991 неоднократно наблюдались семьи из 4-7 молодых и взрослых птиц. В 2013 году в ходе учётов, начиная с 11 апреля, часто встречалась парами на облесенном побережье озера Плещеево и в его окрестностях.

Сорока *Pica pica*. Обычный гнездящийся вид, встречается круглогодично. Придерживается населённых пунктов. На побережье озера Плещеево встречается по окраинам сосняков, ольхово-берёзовых и хвойно-широколиственных лесов, лугам с молодой порослью ели, полям, пустошам. Вглубь сплошных лесных массивов проникает, только если там имеются строения человека. В 2013 году 11 апреля в Переславле-Залесском сорока отмечена с веткой в клюве. В этот же день на восточном побережье озера Плещеево по обочине дороги у одной пары было обнаружено полностью готовое гнездо, у другой пары гнездо находилось на стадии строительства. Все гнёзда размещались в кустах ивы. Группы из 2-6 кочующих сорок наблюдали до 14 апреля 2013.

Кедровка *Nucifraga caryocatactes*. В 2013 году 14 апреля одиночная кедровка отмечена в 0.5 км к югу от стационара Кухмарь; 20 августа в лесных станциях к западу от озера Плещеево была обычна, встречалась неоднократно по 1-2 особи. Вид внесён в 3-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Галка *Corvus monedula*. Обычный гнездящийся синантропный вид Переславля-Залесского. Встречается круглогодично. Весной и поздним летом совершает кормовые кочёвки за пределы города по побережью озера Плещеево в северном направлении стайками до 10 птиц. Обычна галка и в некоторых более мелких населённых пунктах.

Грач *Corvus frugilegus*. Обычный гнездящийся перелётный синантропный вид Переславля-Залесского. Встречается в некоторых населённых пунктах НП «Плещеево озеро». В весенний и позднелетний периоды совершает кормовые кочёвки за пределы города по побережью озера Плещеево в северном направлении. 11 апреля 2013 многие птицы активно собирали строительный материал для гнёзд на улицах Переславля-Залесского.

Серая ворона *Corvus cornix*. Повсеместно обычна. Встречается круглогодично. Гнездится. Повышенная плотность населения вида наблюдается на территории Переславля-Залесского. Населяет как относительно крупные урбанизированные, так и более мелкие селитебные территории. Гнездится как в населённых пунктах, так и за их пределами. В лесных местообитаниях гнездится среди построек человека или рядом с ними. Три осмотренных нами в 2013 году жилых гнёзда располагались на лиственнице, ольхе и липе.

Ворон *Corvus corax*. Повсеместно распространён в котловине озера Плещеево и на смежных территориях. Малочислен. Встречается круглогодично. 26 апреля 1995 гнездо ворона обнаружено в урочище Симак. Оно располагалось на сосне, на высоте примерно 20 м. В гнезде были слышны крики птенцов. 25 мая 2013 в южной части побережья озера Плещеево, в окрестностях устья реки Трубеж (Переславль-Залесский) обнаружено ещё одно жилое гнездо ворона. Оно помещалось на одном из нежилых каменных строений на высоте около 5 м от земли. В гнезде находились 2 птенца, размером немного меньше взрослых.

Свиристель *Vombycilla garrulus*. 9 птиц пролетели над прибрежной пустошью в восточном направлении (западное побережье озера Плещеево) 14 апреля 2013.

Крапивник *Troglodytes troglodytes*. Обычен, но немногочислен. Широко распространён по территории НП «Плещеево озеро» в соответствующих станциях. Населяет смешанные и хвойные леса, захламливаемые валежником. Встречи с крапивником происходили по всей облесенной части побережья озера Плещеево. В течение последних 20 лет обилие его заметно не изменилось. Максимальная плотность населе-

ния вида зарегистрирована в смешанных лесах, примыкающих к северной части побережья озера Плещеево.

Лесная завирушка *Prunella modularis*. Немногочисленный, спорадично распространённый вид прибрежных лесов озера Плещеево. Населяет преимущественно хвойно-широколиственные леса. Одиночные поющие самцы в 2013 году регистрировались нами в период с 27 апреля по 21 мая в лесных массивах северо-восточного и юго-западного побережья озера. В пойме реки Язевка (западное побережье озера) 20 августа встречена кочующая птица.

Речной сверчок *Locustella fluviatilis*. Обычен в соответствующих местообитаниях. Населяет увлажнённые окраины и опушки хвойно-широколиственных лесов, закустаренные пойменные участки лугов, сырые разнотравные луга с наличием ивы, берёзы и ольхи, устья небольших речек, пустоши. В 2013 году поющие самцы отмечены 21 и 23 мая у северных, северо-восточных и юго-западных берегов озера Плещеево. Самая высокая плотность зафиксирована в урочище Кухмарь.

Обыкновенный сверчок *Locustella naevia*. Редкий, предположительно гнездящийся вид. 23 мая 1995 пение 2 самцов отмечено на прибрежных лугах восточного побережья озера Плещеево; 24 мая 1995 поющего самца слышали на западном побережье. Ещё один поющий самец встречен 23 мая 2013 на участке сырого разнотравного луга с разреженным ивняком в окрестностях музея-усадьбы «Ботик Петра I».

Камышевка-барсучок *Acrocephalus schoenobaenus*. В июле 1991-1992 годов была обычна по прибрежно-водным зарослям западного побережья озера Плещеево. 21 мая 2013 поющие самцы были обычны на восточном побережье озера и в пойме реки Векса.

Садовая камышевка *Acrocephalus dumetorum*. В 1991-1992 годах была обычна в июле в урочище Симак. 21 мая 2013 поющие самцы регистрировались по окраинам леса в урочище Кухмарь и в окрестностях истока реки Векса. В Переславле-Залесском на территории Дендросада одиночные самцы пели 25 мая 2013.

Болотная камышевка *Acrocephalus palustris*. В 1991-1992 годах была обычна в июле в урочище Симак. В 2013 году 21 мая поющие самцы отмечались на восточном берегу озера Плещеево и в окрестностях истока Вексы. В Переславле-Залесском в Дендросаду 25 мая 2013 пели одиночки, и в этот же день на окраине Дендросада обнаружено строительство гнезда парой на одной из полей в осочнике. На участке разнотравного луга в пойме реки Трубеж (окрестности Переславля-Залесского) две пары камышевок строили гнёзда в порослях крапивы, расстояние между этими гнёздами не превышало 20 м.

Дроздовидная камышевка *Acrocephalus arundinaceus*. 19 июля 1995 обнаружено жилое гнездо дроздовидной камышевки в пойме Вексы в районе села Купанское. Гнездо располагалось на стеблях трост-

ника у уреза воды, в нём находилось 1 яйцо. В этот же день на отрезке между истоком Вексы из озера Плещеево и её устьем (местом впадения в озеро Сомино) учтены 15 поющих самцов. Вид внесён в 3-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Зелёная пересмешка *Hippolais icterina*. Малочисленный, спорадично распространённый вид. В 1991-1992 годах поющие самцы изредка регистрировались в июле в урочище Симак. В смешанно-широколиственном лесу у северного побережья озера Плещеево 21 мая 2013 пели одиночные самцы. Несколько пересмешек пело 25 мая 2013 в Дендросаду в Переславле-Залесском.

Северная бормотушка *Hippolais caligata*. Активно расширяет границы области гнездования, в том числе и в Европейской части России (Иовченко 2004). До недавнего времени статус её в Ярославской области был не определён (Голубев 2000). В последнее десятилетие встречи с северной бормотушкой в Ярославском Поволжье участились, что связано, скорее всего, с повышенным вниманием к этому виду как специалистов, так и любителей птиц. Совсем недавно опубликован обзор, содержащий анализ встреч северных бормотушек в Ярославской области и сопредельных с ней регионах (Иовченко 2010). В 1930-х годах северная бормотушка фигурировала в списке птиц Переславщины в качестве обыкновенного летующего и гнездящегося вида (Птушенко, Гладков 1933), она была указана и конкретно для кустарников района озера Плещеево (Гладков, Птушенко 1934). На территории НП «Плещеево озеро» нам известны пока всего две встречи бормотушек. Одиночный самец пел 21 мая 2013 на зарастающем лугу севернее озера Плещеево. Другой поющий самец наблюдался в кусте ивы на одуванчиково-осоковом участке луга, граничащего с молодым дубняком в окрестностях Переславля-Залесского 24 мая 2013. Координаты места встречи: 56°46'01.2" с.ш., 38°50'39.3" в.д. Вид внесён в 3-ю категорию Красной книги Ярославской области

Черноголовая славка *Sylvia atricapilla*. Обычный, местами многочисленный, широко распространённый вид. Населяет лиственные и хвойно-лиственные леса. Повышенная плотность населения вида зафиксирована на закустаренных окраинах лесов и лугов, лесных опушках, обочинах лесных дорог. Встречается в населённых пунктах, в том числе и в Переславле-Залесском (например, в Дендросаду).

Садовая славка *Sylvia borin*. Обычна местами, но распределена неравномерно. В июле 1991-1992 годов поющие самцы были обычны, местами многочисленны в смешанных лесах урочища Симак. В 2013 году 21 мая поющие самцы часто регистрировались по окраинам хвойно-широколиственного леса в урочище Кухмарь и в окрестностях устья реки Вексы; в Переславле-Залесском в Дендросаду одиночные самцы пели 25 мая. 22 июня 1995 обнаружено гнездо на окраине сосняка в

урочище Кухмарь. Гнездо помещалось в основании куста черёмухи на высоте 20 см от земли, в нём было 3 птенца и 1 яйцо.

Серая славка *Sylvia communis*. Обычный, местами многочисленный вид птиц территории НП «Плещеево озеро». Населяет пойменные луга, поля, окраины и опушки лесных массивов, населённые пункты. В 1991-1992 годах поющие самцы были немногочисленны в смешанных лесах урочища Симак. В 2013 году в период между 21 мая и 29 июля выявлены участки высокой плотности населения вида в устье реки Кухмарка и в окрестностях поймы реки Векса, на восточном побережье озера и на его прибрежных лугах. В Переславле-Залесском на территории Дендросада 25 мая поющие самцы не представляли редкости. Наиболее поздняя дата встречи серой славки в 2013 году – 19 августа (окрестности поймы реки Язевка).

Славка-завирушка *Sylvia curruca*. Поющие самцы отмечены 25 мая 2013 на территории Дендросада имени С.Ф.Харитонova.

Весничка *Phylloscopus trochilus*. Обычный гнездящийся, местами многочисленный вид лесов и закустаренных лугов национального парка. Населяет почти все типы лесных насаждений, перелески, луга, поросшие ивой и ольхой. Поющие самцы обычны в населённых пунктах, в том числе и в Переславле-Залесском. Наиболее высокая плотность населения веснички зарегистрирована в заболоченном мелколиственном лесу с наличием тростниковых болот, канав и небольших водоёмов (окрестности устья Вексы).

Теньковка *Phylloscopus collybita*. Обычный, широко распространённый вид. Поющие самцы отмечены на территории Переславля-Залесского, в том числе и в Дендросаду. У теньковки выявлен самый широкий спектр местообитаний по сравнению с другими видами пеночек, населяющих территорию НП «Плещеево озеро». Участки высокой плотности населения не выявлены. В разных типах местообитаний показатели плотности населения теньковки невысоки, а распределение её по различным станциям относительно равномерное. В 2013 году первые поющие самцы встречены 16 апреля (урочище Кухмарь).

Трещотка *Phylloscopus sibilatrix*. Обычный вид. 25 мая 2013 несколько поющих самцов зарегистрированы на территории Дендросада. Населяет преимущественно разной степени заболоченности хвойно-широколиственные леса из ели, сосны, осины, берёзы и дуба. Участки повышенной плотности выявлены в хвойно-широколиственных лесах, примыкающих к северному побережью озера Плещеево.

Зелёная пеночка *Phylloscopus trochiloides*. Обычна, местами многочисленна по прибрежным лесам озера Плещеево. Распределена неравномерно. Поющие самцы многократно регистрировались нами в Переславле-Залесском, в том числе в Дендросаду. Населяет хвойно-широколиственные леса. Участки повышенной плотности населения

зелёной пеночки выявлены в лесных массивах, примыкающих к северному побережью озера Плещеево.

Желтоголовый королёк *Regulus regulus*. Малочисленный вид прибрежных лесов озера Плещеево. Встречается круглогодично. В Переславле-Залесском королёк наблюдался только на территории Дендросада (26 апреля 2013). Населяет преимущественно сосново-еловые леса с серой и чёрной ольхой, берёзой и дубом, елово-ольховые леса, расположенные севернее озера Плещеево. Регистрируется обычно в составе синичьих стай. Наиболее поздняя регистрация песни – 22 мая 2013. В 1991 году 1-4 июля неоднократно регистрировались выводки желтоголовых корольков в сосново-еловом лесу побережья озера Плещеево (урочище Кухмарь).

Мухоловка-пеструшка *Ficedula hypoleuca*. Обычный вид прибрежных лесов озера Плещеево. Территориальные самцы отмечены нами в Переславле-Залесском, в том числе и в Дендросаду. Населяет спелые лиственные, хвойно-лиственные и хвойные леса. В 2013 году поющие самцы регистрировались в период с 26 апреля по 25 мая.

Малая мухоловка *Ficedula parva*. В 2013 году малая мухоловка обнаружена только в хвойно-широколиственных лесах, примыкающих к северному побережью озера Плещеево. Участок высокой плотности населения вида выявлен 22 мая вдоль грунтовой дороги на деревню Студенец в смешанно-широколиственном лесу, состоящем из осины, берёзы, ели с примесью сосны и дуба.

Серая мухоловка *Muscicapa striata*. В начале 1990-х годов в гнездовой период серая мухоловка была обычна в урочище Симак, где трижды находили её жилые гнёзда. В 2013 году была редка: 21 мая в хвойно-широколиственном лесу урочища Кухмарь зарегистрированы 2 птицы, одиночки встречены 25 мая в Переславле-Залесском на территории Дендросада имени С.Ф.Харитонova.

Луговой чекан *Saxicola rubetra*. Обычный немногочисленный вид. Населяет прибрежные луга, примыкающие преимущественно к восточному побережью озера Плещеево. В 2013 году первые птицы отмечены нами 27 апреля (2 самца кормились среди полузатопленной растительности на восточном берегу озера Плещеево). Гнездо с кладкой из 7 ненасиженных яиц обнаружено 24 мая на одуванчиково-осоковом лугу в окрестностях села Никитская Слобода. Гнездо помещалось в злаковой кочке и сверху было скрыто нависшим пучком травы. Гнездо с кладкой хранится в фондах Зоомузея Ярославского университета. 28 июля 2013 луговые чеканы ещё продолжали встречаться в местах своего гнездования.

Обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe*. Встречена на весеннем пролёте. В 2013 году одиночные птицы и группы до 3 особей (самцы и самки) наблюдались 14-15 и 17 апреля на обочинах дорог восточ-

ного побережья озера Плещеево. Направление миграций каменок — северо-восточное.

Обыкновенная горихвостка *Phoenicurus phoenicurus*. 25 мая 2013 поющий самец держался в Дендросаду в Переславле-Залесском. 30 июля 2013 в куртине кустов среди суходола около устья Кухмарки встречена самка.

Зарянка *Erithacus rubecula*. Обычный, широко распространённый, местами многочисленный вид. Населяет закустаренные луга, пустоши, все типы лесных насаждений. Предпочитает захламлинные тенистые леса с наличием подлеска. Отмечена в населённых пунктах, в том числе и в Переславле-Залесском (Дендросад). В 2013 году на весеннем пролёте регистрировалась 14-17 апреля. Начало пролёта дружное. Птицы встречались практически повсеместно, за исключением сплошных лесных массивов. Некоторые самцы активно пели в утренние и дневные часы.

Соловей *Luscinia luscinia*. Обычный вид прибрежных лугов озера Плещеево. Поющие самцы отмечены нами также на окраинах Переславля-Залесского и в Дендросаду. В 2013 году пение самцов регистрировали 1-25 мая.

Варакушка *Luscinia svecica*. Обычна на прибрежных лугах озера Плещеево. Первый поющий самец отмечен 27 апреля 2013; 28 июля 2013 на закустаренных лугах отмечены молодые в гнездовом наряде.

Рябинник *Turdus pilaris*. Обычный, широко распространённый гнездящийся вид территории НП «Плещеево озеро». Населяет всевозможные лесные насаждения. Встречается и гнездится в населённых пунктах. В отдельные годы некоторые особи остаются на зимовку. В 2013 году первые мигрирующие особи зарегистрированы в окрестностях стационара Кухмарь 14 апреля. В последующие дни количество встреченных птиц увеличивалось и было максимальным 17 апреля. К концу третьей декады апреля пролёт завершился. На весеннем пролёте стаи рябинников и одиночки пересекают котловину озера и его окрестности транзитно или совершают непродолжительные остановки на побережье. Основной поток мигрирующих весной птиц движется в восточном направлении. В начале 1990-х годов рябинники гнездились в урочище Симак. 23 мая 2013 в окрестностях стационара Кухмарь в сосново-лиственном лесу обнаружена рыхлая колония, состоящая из 5 жилых гнёзд. 25 мая 2013 одиночные жилые гнёзда обнаружены в Переславле-Залесском на территории Дендросада.

Чёрный дрозд *Turdus merula*. Массовый вид птиц в период весенних миграций. В гнездовой период малочислен, редок. В период миграций встречается в населённых пунктах и на их окраинах. Регистрируется в Переславле-Залесском. Населяет лиственные, хвойные и смешанные леса. В 2013 году 13-17 апреля был массовым пролётным

видом на восточном побережье озера Плещеево, фоновым среди других мигрирующих дроздов. Встречен во всех типах древесных насаждений, но в сплошных лесных массивах очень редок. Пролёт происходил широким фронтом. Мигрировали одиночные особи, пары или группы до 5 птиц, в которых наблюдались самцы и самки. Некоторые самцы пели. Направление миграций восточное, юго-восточное и южное. К концу третьей декады апреля пролёт завершился. Песни территориальных самцов были слышны до конца мая по всему облесенному побережью озера. Наиболее поздняя регистрация чёрного дрозда в национальном парке в 2013 году состоялась 4 октября: 2 самца держались в разреженном ельнике в окрестностях устья Кухмарки. В начале 1990-х годов чёрный дрозд очень редко встречался в лесах западного побережья озера Плещеево (урочище Симак). Ныне обилие этого дрозда заметно возросло в гнездовой период, стали наблюдаться ярко выраженные его весенние миграции. Рост численности чёрного дрозда на территории НП «Плещеево озеро» согласуется с общим ростом численности этого вида, начавшимся в Ярославском Поволжье 10 лет назад. Внесён в 3-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Белобровик *Turdus iliacus*. Немногочислен, распространён спорадично. Населяет лиственные (широколиственные и мелколиственные) и смешанные леса, перелески. Встречается в населённых пунктах. В 2013 году первый белобровик отмечен 16 апреля (окрестности стационара Кухмарь).

Певчий дрозд *Turdus philomelos*. Обычный гнездящийся вид прибрежных лесов озера Плещеево. Населяет хвойные (сосновые, еловые), хвойно-мелколиственные и хвойно-широколиственные леса. В гнездовой период максимальная плотность населения вида зафиксирована в сосняках, местами заболоченных, с вкраплениями участков смешанных лесов и черноольшаников. В 2013 году прилёт первого одиночного певчего дрозда зарегистрирован 14 апреля; 14-17 апреля на весеннем пролёте он был малочислен, мигрировал одиночными особями. Направление пролёта – восточно-юго-восточное. Жилые и нежилые гнёзда певчего дрозда обнаружены в 1991-1992 годах в урочище Симак. 20 августа 2013 в пойме реки Змейка встречен плохо летающий слёток с неотросшими рулевыми перьями.

Деряба *Turdus viscivorus*. Малочисленный пролётный, вероятно гнездящийся вид. Встречается в лесных массивах, расположенных севернее и западнее озера Плещеево. Населяет спелые высокоствольные сосняки с примесью ели, пойменные сосняки, заболоченные участки сосново-лиственных лесов с примесью чёрной ольхи, сосново-берёзовые леса, облесенные окраины болот. В 2013 году на весеннем пролёте впервые наблюдался 15 апреля. Направление пролёта юго-восточное. Вид внесён в 3-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Ополовник *Aegithalos caudatus*. Круглогодично встречающийся, немногочисленный вид лесов, закустаренных лугов и пустошей, окружающих озеро Плещеево. В негнездовой период широко кочует стайками до 20 особей. Встречается в Переславле-Залесском, в том числе и на территории Дендросада.

Пухляк *Parus montanus*. Обычный, круглогодично встречающийся вид лесов, окружающих озеро Плещеево. Населяет все типы лесных насаждений. Наиболее высокая плотность населения зарегистрирована в хвойно-широколиственных лесах.

Хохлатая синица *Parus cristatus*. Малочисленный, спорадично распространённый вид территории НП «Плещеево озеро». Большинство регистраций птиц в 2013 году (11, 14 и 30 апреля) произошло в окрестностях стационара Кухмарь и на его территории, одна – в окрестностях Блудова болота (29 июля). Таким образом, все случаи обнаружения хохлатых синиц приурочены к лесным массивам у северного побережья озера Плещеево. Населяет сосняки; ельники с дубом, серой и чёрной ольхой; ельники с берёзой и серой ольхой. Держится одиночно или парами, обычно в синичьих стаях, кочующих по лесу.

Московка *Parus ater*. Малочисленный оседлый вид прибрежных лесов озера Плещеево. Населяет преимущественно смешанно-широколиственные леса, примыкающие к северному и к западному участкам побережья озера Плещеево. В гнездовой период московка регистрировалась в Переславле-Залесском (Дендросад). В начале 1990-х годов очень редко встречалась в гнездовой период в урочище Симак. В 2013 году 13-16 апреля в лесах северного побережья озера часто наблюдалась парами, отдельные самцы пели. Наиболее позднее пение самца зарегистрировано 20 августа (окрестности реки Язевка). Участок относительно высокой плотности московки выявлен в хвойно-широколиственном лесном массиве урочища Кухмарь.

Обыкновенная лазоревка *Parus caeruleus*. Немногочисленный вид лесов, зарастающих лугов и пустошей, окружающих озеро Плещеево. Встречается круглогодично. Иногда наблюдается в Переславле-Залесском, в том числе и в Дендросаду. В 2013 году пение самцов регистрировалось в период с 13 по 27 апреля. В эти же сроки лазоревки держались парами. По лесу кочуют в составе синичьих стай.

Большая синица *Parus major*. Повсеместно обычна, круглогодично обитает на территории НП «Плещеево озеро».

Поползень *Sitta europaea*. Обычный, но немногочисленный оседлый вид. Населяет все типы лесов, примыкающих к побережью озера Плещеево. Встречается преимущественно в лесах, расположенных севернее и западнее от озера. В 2013 году пение поползней регистрировалось 13-16 апреля. В заболоченном смешанном лесу у северного побережья озера Плещеево 27 апреля 2013 в осине на высоте 5 м обна-

ружено дупло естественного происхождения, рядом с которым сильно беспокоилась пара поползней.

Обыкновенная пищуха *Certhia familiaris*. Малочисленный круглогодично встречающийся вид прибрежных лесов озера Плещеево. Населяет хвойные и лиственные леса, но чаще встречается в хвойно-лиственных лесах. Обычно одиночные птицы кочуют по лесу в составе синичьих стай. Повышенное обилие пищух выявлено 28 июля 2013 в смешанном лесном массиве урочища Кухмарь.

Домовый воробей *Passer domesticus*. Обычный гнездящийся синантропный вид Переславля-Залесского, обитает там круглогодично.

Полевой воробей *Passer montanus*. Обычный гнездящийся синантропный вид Переславля-Залесского, обитает там круглогодично. Небольшие поселения выявлены в селе Никитская Слобода, в посёлке Купанское, в деревнях Грачковская Слобода, Соломидино.

Зяблик *Fringilla coelebs*. Обычный гнездящийся и пролётный вид, широко распространённый в НП «Плещеево озеро». Встречается и гнездится в населённых пунктах, в том числе и в Переславле-Залесском. Населяет все типы лесных насаждений. Участки повышенной плотности населения выявлены в хвойно-широколиственных и сосновых лесах, примыкающих к северному и северо-западному побережью озера Плещеево. В 2013 году первые мигрирующие зяблики отмечены 14 и 16-17 апреля, мигрировали широким фронтом по открытым пространствам и были одними из массовых пролётных видов птиц. Отдельные поющие самцы встречались в перелесках у восточного побережья, но не были местными. Направление весенних миграций восточное и юго-восточное. В 2013 году в третьей декаде апреля большинство самцов имели свои территории и пели.

Юрок *Fringilla montifringilla*. В 2013 году на весеннем пролёте был малочислен. Регистрировался транзитно 13-14 апреля одиночно или парами. Направление пролёта восточное. 27 апреля 2013 около истока Вексы в стайке, состоящей из самок зябликов, держалась пара юрков, самец в которой пел. 30 апреля 2013 поющий самец отмечен на участке заболоченного березняка в окрестностях Блудова болота.

Зеленушка *Chloris chloris*. Обычна, но немногочисленна на весеннем пролёте и кочёвках по побережью озера Плещеево. Вероятно, гнездится в НП «Плещеево озеро» и в Переславле-Залесском (Дендросад). В 2013 году на побережье озера с 13 по 16 апреля встречали одиночек, пары и стайки до 7 птиц, перемещающиеся в разных направлениях. Завершился пролёт 29 апреля. С 26 апреля 2013 стали наблюдаться местные, возможно, территориальные птицы. Наиболее позднее пение в 2013 году зафиксировано 21 мая (устье реки Кухмарка).

Чиж *Spinus spinus*. Обычен, но немногочислен на весеннем пролёте и послегнездовых кочёвках. В 2013 году наблюдался на протяжении

всего периода обследования территории. 13-16 апреля на восточном побережье озера Плещеево регистрировались транзитные одиночки и небольшие стайки до 13 птиц; с 27 апреля в стаиках стали попадаться поющие самцы. Направление весеннего пролёта северо-восточное. На послегнездовых кочёвках стаи чижей отмечены 19 августа 2013 (сосняк в окрестностях Блудова болота).

Черноголовый щегол *Carduelis carduelis*. Обычен на весеннем пролёте и кочёвках. Возможно, гнездится. В начале 1990-х годов поющие самцы неоднократно регистрировались в гнездовой период по окраинам урочища Симак. В 2013 году отмечался с 11 по 27 апреля в смешанных лесах, на прибрежных лугах и пустошах одиночно или стаями до 15 особей (восточное побережье озера Плещеево). 25 мая поющий самец держался в Дендросаде имени С.Ф.Харитоновна.

Коноплянка *Acanthis cannabina*. В начале 1990-х годов была обычна в гнездовой период в урочище Симак. В 1995 году в апреле-мае регулярно регистрировались на восточном и западном побережьях озера Плещеево. В 2013 году 13 апреля в окрестностях стационара Кухмарь пролетела пара, 14 апреля у деревни Городище наблюдался поющий нетерриториальный самец. 1 мая 2013 в селе Никитская Слобода отмечена пара.

Обыкновенная чечётка *Acanthis flammea*. В 2013 году на весенних кочёвках и пролёте (13-16 апреля) была одной из наиболее массовых среди мигрантов. Кочующие одиночки и стайки перемещались в разных направлениях. Общее направление пролёта не выражено. Наиболее крупные стаи чечёток, состоящие из 35 и 45 особей, обнаружены на восточном и северо-восточном побережье озера Плещеево.

Чечевица *Carpodacus erythrinus*. Поющих самцов наблюдали 21 мая 2013 в облесенной северной части берега озера Плещеево. 23 мая 1995 отмечено строительство гнезда в перелеске у деревни Криушкино.

Клест-еловик *Loxia curvirostra*. Стая из 10 особей встречена на западном берегу озера Плещеево в сосняке урочища Симак 26 апреля 1995.

Снегирь *Pyrrhula pyrrhula*. В осенне-зимний и ранневесенний периоды обычен, но немногочислен. В гнездовой период малочислен. На территории НП «Плещеево озеро» встречается круглогодично. Населяет леса разного типа. Встречается в населённых пунктах, в том числе и в Переславле-Залесском.

Дубонос *Coccothraustes coccothraustes*. В 2013 году на территории Дендросада имени С.Ф.Харитоновна 26 апреля отмечена пара, 25 мая – одиночный самец.

Обыкновенная овсянка *Emberiza citrinella*. В 1995 году встречалась повсеместно на побережьях озера Плещеево в течение всего гнездового сезона. Обычна на весенних кочёвках преимущественно по во-

сточному побережью озера Плещеево, где в 2013 году она регистрировалась на лесных дорогах, опушках, пустошах и прибрежных лугах 13-17 апреля одиночно и стайками до 8 птиц. Чаще держалась парами, самцы в которых активно пели. После 30 апреля на обследуемой территории эта овсянка не встречалась.

Тростниковая овсянка *Emberiza schoeniclus*. Обычна на пролёте и в местах размножения. На озере Плещеево населяет необлесенное побережье – влажные участки прибрежных лугов и заболоченные берега с кустарником. Кормиться эти птицы предпочитают среди подтопленной прибрежной растительности. Тростниковая овсянка распространена неравномерно, местами образует очаги высокой плотности. Максимальная плотность населения выявлена на побережье озера и его прибрежных лугах. Первые пролётные птицы в 2013 году отмечены 14 апреля. Пролёт начался дружно. Птицы мигрировали одиночно, парами и небольшими стайками, в которых присутствовали как самцы, так и самки. Весенние перемещения овсянок шли в двух направлениях – восточном и южном. Самцы активно пели на протяжении третьей декады апреля. Заметный спад вокализации многих самцов зафиксирован 1 мая, а в последующие дни участились подаваемые птицами сигналы тревоги, которые косвенно указывали на появление кладок. 23 мая 1995 на прибрежных лугах озера Плещеево обнаружены два гнезда с 4 и 6 яйцами.

Овсянка-ремез *Emberiza rustica*. 4 июля 1991 самец встречен на опушке елово-соснового леса (урочище Симак). Вид внесён в 4-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Дубровник *Emberiza aureola*. Территориальный самец обнаружен 22 июня 1995 на сыром пойменном лугу в районе устья Кухмарки. 23 июня 1995 четыре поющих самца и самка с признаками беспокойства обнаружены на лугах южного берега озера Плещеево недалеко от границы Переславля-Залесского. Вид внесён во 2-ю категорию Красной книги Ярославской области.

Плотность населения птиц национального парка «Плещеево озеро»

Сделанные оценки плотности населения птиц НП «Плещеево озеро» мы свели в таблицу в соответствии с выделенными нами 6 типами местообитаний.

1) Прибрежные, местами заболоченные луга; пустошь. Дата учёта: 14-15 апреля 2013. Время: 8 ч 00 мин. Пройдено: 21.76 км. Маршрут: участок восточного побережья озера Плещеево между стационаром Кухмарь и Переславлем-Залесским.

2) Заболоченные елово-сосновые леса с ольхой и берёзой, местами с включением чёрной ольхи и дуба. Дата учёта: 11, 13-14 апреля 2013. Время: 15 ч 10 мин. Пройдено: 45.50 км. Маршрут: лесной массив у северного побережья озера Плещеево между стационаром Кухмарь и селом Купанское.

3) Заболоченный мелколистственный лес с тростниковыми болотами, мелкими водоёмами и канавами. Дата учёта: 21 мая 2013. Время: 2 ч 40 мин. Пройдено:

6 км. Маршрут: лесной массив у северного побережья озера Плещеево между стационаром Кухмарь, устьем реки Векса и селом Купанское.

4) Побережье озера и прибрежные луга. Дата учёта: 27 апреля и 21 мая 2013. Время: 3 ч 40 мин. Пройдено: 9.95 км. Маршрут: северо-восточное побережье озера Плещеево между селом Городище и устьем реки Кухмарка.

5) Сосняки, местами заболоченные, с вкраплениями участков смешанных лесов, черноольшаников, березово-ивовых мелколесий, болот. Дата учёта: 30 апреля 2013. Время: 3 ч 40 мин. Пройдено: 9.22 км. Маршрут: северное и западное побережье озера Плещеево (село Купанское – урочище Симак).

6) Хвойно-широколиственные леса с елью, сосной, осиной, берёзой, дубом и вкраплениями черноольшаников и тростниковых болот. Дата учёта: 27 апреля – 22 мая 2013. Время: 7 ч. Пройдено: 17.46 км. Маршрут: Заладьевское лесничество – Варварин ключ – старый карьер – пересечение грунтовой дороги Кухмарь–Купань с бывшей узкоколейкой в направлении села Купанского.

Плотность населения птиц в различных типах местообитаний НП «Плещеево озеро» по данным учётов в весенне-летний период 2013 года (ос./км²)
Выделенные местообитания (1-6) описаны в тексте.

Вид	Местообитания					
	1	2	3	4	5	6
Большая выпь <i>Botaurus stellaris</i>	-	-	-	-	1.6	-
Серая цапля <i>Ardea cinerea</i>	0.02	-	-	4.94	0.05	0.03
Белолобый гусь <i>Anser albifrons</i>	-	-	-	0.38	-	-
Гуменник <i>Anser fabalis</i>	-	-	-	0.02	-	-
Кряква <i>Anas platyrhynchos</i>	-	0.2	43.73	45.67	36.04	2.74
Чирок-свистунок <i>Anas crecca</i>	-	-	-	11.42	-	4.61
Связь <i>Anas penelope</i>	-	-	-	3.8	0.18	-
Шилохвость <i>Anas acuta</i>	-	-	-	0.46	-	-
Серая утка <i>Anas strepera</i>	-	-	-	0.46	-	-
Чирок-трескунок <i>Anas querquedula</i>	-	-	-	38.45	8.13	-
Широконоска <i>Anas clypeata</i>	-	-	1.19	9.59	-	-
Хохлатая чернеть <i>Aythya fuligula</i>	-	-	-	2.74	-	-
Обыкновенный гоголь <i>Bucephala clangula</i>	-	-	-	6.25	-	-
Длинноносый крохаль <i>Mergus serrator</i>	-	-	-	0.69	-	-
Скопа <i>Pandion haliaetus</i>	-	-	-	0.11	-	-
Осоед <i>Pernis apivorus</i>	-	0.01	-	-	-	1.06
Чёрный коршун <i>Milvus migrans</i>	-	-	-	0.035	-	-
Тетеревятник <i>Accipiter gentilis</i>	0.77	-	-	-	-	-
Перепелятник <i>Accipiter nisus</i>	-	-	-	-	-	0.05
Обыкновенный канюк <i>Buteo buteo</i>	0.01	0.27	-	-	-	0.05
Подорлик sp. <i>Aquila</i> sp.	0.01	-	-	-	-	-
Чеглок <i>Falco subbuteo</i>	-	-	-	0.02	-	0.01
Тетерев <i>Lyrurus tetrix</i>	-	0.1	-	-	-	-
Глухарь <i>Tetrao urogallus</i>	-	-	-	-	3.25	-
Рябчик <i>Tetrastes bonasia</i>	-	0.74	5.56	4.17	27.89	6.93
Коростель <i>Crex crex</i>	-	-	3.3	-	-	1.48
Чибис <i>Vanellus vanellus</i>	0.06	-	-	-	-	-
Черныш <i>Tringa ochropus</i>	-	-	2.78	5.1	4.11	4.63
Большой улит <i>Tringa nebularia</i>	0.01	-	-	0.11	-	-
Травник <i>Tringa totanus</i>	-	-	-	10.95	-	-
Перевозчик <i>Actitis hypoleucos</i>	-	-	-	1.14	-	-
Бекас <i>Gallinago gallinago</i>	-	-	1.19	2.29	13.8	-
Дупель <i>Gallinago media</i>	-	-	-	4.57	-	-

Продолжение таблицы

Вид	Местообитания					
	1	2	3	4	5	6
Вальдшнеп <i>Scolopax rusticola</i>	0.77	0.29	-	-	-	-
Озерная чайка <i>Larus ridibundus</i>	0.03	-	-	13.12	-	-
Серебристая чайка <i>Larus argentatus</i>	0.01	-	-	0.56	-	-
Сизая чайка <i>Larus canus</i>	0.06	-	-	2.88	-	-
Черная крачка <i>Chlidonias niger</i>	-	-	-	0.86	-	-
Речная крачка <i>Sterna hirundo</i>	-	-	-	0.28	-	-
Вяхрь <i>Columba palumbus</i>	-	0.005	-	0.07	0.09	0.6
Обыкновенная кукушка <i>Cuculus canorus</i>	-	-	6.9	-	1.6	0.6
Вертишейка <i>Jynx torquilla</i>	0.77	0.003	-	2.57	-	-
Седой дятел <i>Picus canus</i>	-	-	-	-	-	0.99
Желна <i>Dryocopus martius</i>	-	0.24	1.19	-	2.22	-
Большой пёстрый дятел <i>Dendrocopos major</i>	0.92	4.72	-	2.34	5.66	0.99
Белоспинный дятел <i>Dendrocopos leucotos</i>	-	0.71	-	6.85	-	-
Малый пёстрый дятел <i>Dendrocopos minor</i>	-	1.04	-	-	1.81	0.99
Деревенская ласточка <i>Hirundo rustica</i>	-	-	-	1.08	-	-
Полевой жаворонок <i>Alauda arvensis</i>	0.18	-	-	0.12	-	-
Лесной конёк <i>Anthus trivialis</i>	0.06	0.005	19.6	3.25	21.7	19
Луговой конёк <i>Anthus pratensis</i>	0.39	-	-	6.85	-	-
Жёлтая трясогузка <i>Motacilla flava</i>	0.02	-	-	56.72	-	-
Желтоголовая трясогузка <i>Motacilla citreola</i>	-	-	-	5.93	-	-
Белая трясогузка <i>Motacilla alba</i>	18.01	0.66	-	76.34	-	3
Обыкновенный жулан <i>Lanius collurio</i>	-	-	1.19	10.25	-	-
Серый сорокопут <i>Lanius excubitor</i>	0.02	-	-	-	-	-
Иволга <i>Oriolus oriolus</i>	-	-	3.69	0.69	-	0.42
Обыкновенный скворец <i>Sturnus vulgaris</i>	0.39	-	-	112.4	-	-
Сойка <i>Garrulus glandarius</i>	-	2.13	2.78	-	2.89	0.8
Сорока <i>Pica pica</i>	10.88	1.55	-	15.43	1.36	-
Кедровка <i>Nucifraga caryocatactes</i>	0.23	-	-	-	-	-
Галка <i>Corvus monedula</i>	0.04	0.02	-	-	-	-
Грач <i>Corvus frugilegus</i>	0.03	0.01	-	-	-	-
Серая ворона <i>Corvus cornix</i>	10.79	2.44	-	19.3	0.09	0.3
Ворон <i>Corvus corax</i>	0.29	0.005	0.03	0.045	0.29	-
Свиристель <i>Bombycilla garrulus</i>	0.63	-	-	-	-	-
Крапивник <i>Troglodytes troglodytes</i>	0.69	1.02	8.3	-	1.5	7.38
Лесная завирушка <i>Prunella modularis</i>	-	-	-	-	-	4.6
Речной сверчок <i>Locustella fluviatilis</i>	-	-	11.3	6.15	-	4.6
Камышевка-барсучок <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	-	-	6.5	21.7	-	-
Садовая камышевка <i>Acrocephalus dumetorum</i>	-	-	27.8	4.55	-	10.35
Болотная камышевка <i>Acrocephalus palustris</i>	-	-	15.3	13.7	-	-
Зелёная пересмешка <i>Hippolais icterina</i>	-	-	7.5	-	-	1.18
Северная бормотушка <i>Hippolais caligata</i>	-	-	5.6	-	-	-
Черноголовая славка <i>Sylvia atricapilla</i>	-	-	24.2	4.55	-	28.68
Садовая славка <i>Sylvia borin</i>	-	-	98.3	-	-	15.75
Серая славка <i>Sylvia communis</i>	-	-	26.4	56.4	-	2
Весничка <i>Phylloscopus trochilus</i>	-	0.03	85.3	6.4	20.8	6.5
Теньковка <i>Phylloscopus collybita</i>	-	0.25	44.3	2.95	50.8	39.8
Трещотка <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	-	-	37.7	-	6.3	55.1
Зелёная пеночка <i>Phylloscopus trochiloides</i>	-	-	24.2	-	-	22.25
Желтоголовый королёк <i>Regulus regulus</i>	-	6.22	-	-	3.6	2.4
Мухоловка-пеструшка <i>Ficedula hypoleuca</i>	-	-	24.2	-	7.6	43.75
Малая мухоловка <i>Ficedula parva</i>	-	-	-	-	-	15.4
Серая мухоловка <i>Muscicapa striata</i>	-	-	-	-	-	1.97

Вид	Местообитания					
	1	2	3	4	5	6
Луговой чекан <i>Saxicola rubetra</i>	-	-	8.33	13.95	-	-
Обыкновенная каменка <i>Oenanthe oenanthe</i>	3.54	-	-	-	-	-
Зарянка <i>Erithacus rubecula</i>	12.53	0.9	-	2.95	36.5	29.9
Соловей <i>Luscinia luscinia</i>	-	-	4.2	17.15	-	2
Варакушка <i>Luscinia svecica</i>	-	-	-	20	-	-
Рябинник <i>Turdus pilaris</i>	0.92	1.87	-	43.93	-	-
Чёрный дрозд <i>Turdus merula</i>	25.2	8.77	1.7	-	-	2.5
Белобровик <i>Turdus iliacus</i>	-	0.07	-	4.8	1.81	-
Певчий дрозд <i>Turdus philomelos</i>	0.81	0.12	1.7	1	33.5	11.4
Деряба <i>Turdus viscivorus</i>	0.02	0.18	-	-	6	0.19
Ополовник <i>Aegithalos caudatus</i>	-	15.39	-	-	5.42	6.25
Пухляк <i>Parus montanus</i>	3.83	17.62	5.6	-	37.1	33.5
Хохлатая синица <i>Parus cristatus</i>	0.23	0.53	-	-	2.71	-
Московка <i>Parus ater</i>	-	3.52	-	-	-	8.5
Обыкновенная лазоревка <i>Parus caeruleus</i>	8.58	7.37	-	1.7	-	-
Большая синица <i>Parus major</i>	14.71	15.87	4.2	1.7	33	24.58
Поползень <i>Sitta europea</i>	0.46	0.65	-	-	1.81	-
Обыкновенная пищуха <i>Certhia familiaris</i>	-	0.7	-	-	-	-
Зяблик <i>Fringilla coelebs</i>	3.45	3.43	38.1	16.9	147.7	128
Юрок <i>Fringilla montifringilla</i>	0.95	0.02	-	-	3.6	-
Зеленушка <i>Chloris chloris</i>	5.67	0.01	-	8.65	-	-
Чиж <i>Spinus spinus</i>	2.3	0.4	0.13	-	2.71	1.67
Черноголовый щегол <i>Carduelis carduelis</i>	4.09	0.1	-	1.35	-	0.08
Коноплянка <i>Acanthis cannabina</i>	0.77	0.02	-	-	-	-
Обыкновенная чечётка <i>Acanthis flammea</i>	1.13	1.5	-	-	-	-
Обыкновенная чечевица <i>Carpodacus erythrinus</i>	-	-	7.5	6.15	-	1.2
Обыкновенный снегирь <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	7.51	2.45	-	-	5.42	9.5
Обыкновенная овсянка <i>Emberiza citrinella</i>	8.52	0.68	-	-	3.62	-
Тростниковая овсянка <i>Emberiza schoeniclus</i>	6.34	-	-	75.25	2.2	-
Итого (ос./км²):	157.65	104.84	611.49	823.13	546.46	530.46

Заключение

На обследованной территории национального парка «Плещеево озеро» удалось выявить 171 вид птиц. Несомненно, что приведённый список птиц не в полной мере отражает состав авифауны данной местности и в дальнейшем будет дополняться новыми видами. Для определённой части видов удалось доказать гнездование (находки гнёзд, птенцов), для значительной части видов гнездование лишь предполагается. Вместе с этим, многие виды, встреченные один или несколько раз, имеют пока неопределённый статус. Уточнение статуса целого ряда видов птиц – важная перспективная задача. Ещё одной насущной задачей следует считать мониторинг плотности населения птиц и их общей численности на данной территории. Полученные количественные оценки позволяют судить о состоянии экосистемы, эффективности её охраны, оптимизации природопользования и популяционных трендах видов, особенно редких и уязвимых птиц.

Приведём и некоторые общие замечания, связанные с состоянием авифауны национального парка «Плещеево озеро» и мерами по её охране. Плещеево – относительно крупное озеро с обширными мелководьями и богатой кормовой базой, создаёт благоприятные условия для обитания околотовных видов птиц. Но в то же время возможности для гнездования у данных видов относительно ограничены, поскольку площади, занятые прибрежно-водной растительностью, невелики, а прибрежные луга либо зарастают кустарником и мелкоколесем, либо подвергаются рекреационному прессу. Пик рекреации совпадает с гнездовым сезоном птиц, что ещё более усугубляет ситуацию. В связи с этим озеро как место гнездования используется небольшим числом прибрежных видов птиц. К ним относятся в основном воробьиные – тростниковая овсянка, варакушка, белая трясогузка и др. Ряд видов за годы наблюдений значительно сократили свою численность на гнездовании или вовсе перестал гнездиться в прибрежных стациях. К таким относятся чомга, травник, чибис, обыкновенная овсянка, дубровник и ряд других видов. Преимущество в данной ситуации получают виды, гнездящиеся в лесных стациях, а озеро использующие как кормовую стацию. В первую очередь это серая цапля, численность которой сильно возросла за период исследований. Благоприятна сложившаяся ситуация и для скопы, которая регулярно встречалась на озере.

Многие виды водяных птиц используют озеро как место остановки во время пролёта и при летовании. К таким видам относятся практически все встречающиеся здесь утки, многие кулики и чайковые. Привлекательность озера для них обусловлена в первую очередь высокой кормностью водоёма и его защитными свойствами. С возрастанием рекреационной нагрузки на Плещеево озеро количество летующих и мигрирующих птиц может значительно снизиться.

На территории национального парка «Плещеево озеро» не выявлены места крупных пролётных скоплений гусей (белолобых гусей и гуменников) в период весенне-осенних миграций, как, например, на берегах Рыбинского водохранилища (Голубев 1997). По данным опроса В.Б.Охотина, на озере в период пролёта изредка останавливаются на отдых гусиные стаи, не превышающие 100 особей. Нами не обнаружены предотлётные скопления и места остановок серых журавлей. Это обусловлено отсутствием на территории парка крупных открытых пространств, которые могли бы использоваться этими птицами в качестве мест отдыха и кормёжки.

Леса в национальном парке не испытывают на себе большого негативного антропогенного воздействия и имеют хорошую сохранность. Связано это с их малой посещаемостью и их охраной. Большинство лесных видов птиц имеет здесь стабильную численность. Плотность населения ряда видов здесь выше, чем в других местах Ярославской

области. В качестве примера можно привести рябчика, который, не испытывая пресса охоты, имеет большую численность. Опасения вызывает глухарь, количество самцов которого на токах заметно снизилось в последние годы. Состояние локальной популяции этого вида должно находиться под постоянным наблюдением сотрудников парка.

Такие виды, как чёрный дрозд и московка, имеют на территории парка значительно более высокую численность, чем в других местах Ярославского Поволжья. Связано это, предположительно, с наличием в окрестностях озера Плещеево участков смешанно-широколиственных лесов, не характерных для региона.

Из рекомендаций по сохранению авифауны НП «Плещеево озеро» укажем на необходимость: выделения зон покоя на участках побережья озера для водоплавающих и околоводных птиц; регуляции рекреационной нагрузки на территории парка; организации искусственных гнездовий с целью привлечения на гнездование крохалей, гоголя, скопы, орлана-белохвоста, некоторых видов сов. Желательна развеска дуплянок для размножения ряда видов воробьиных птиц, гнездящихся в дуплах деревьев. Зимняя подкормка необходима для серой куропатки. Следует развивать любительское наблюдение за птицами как часть программы, направленной на организованный отдых туристов. Экологическое просвещение населения (публикация сведений о состоянии природной среды национального парка в научных и научно-популярных изданиях, проведение семинаров, олимпиад, лекций, дней птиц и пр.) может способствовать более бережному отношению человека к природным ценностям территории.

Мы надеемся, что сведения, опубликованные в данной статье, станут основой для дальнейшего, более углублённого изучения фауны птиц национального парка «Плещеево озеро» и послужат дополнением к уже разработанной и проводимой национальным парком грамотной экологической политике, направленной на охрану и восстановление уникальной экосистемы этого озера.

Мы выражаем благодарность администрации национального парка «Плещеево озеро» за финансовую поддержку и всестороннее содействие в организации и проведении наших полевых работ. Особую признательность хочется выразить заместителю директора по научной работе Г.М.Кафиевой, участковому государственному инспектору В.Б.Охотину и другим сотрудникам национального парка.

Литература

- Бюллетень по Красной книге Ярославской области. 2010. Ярославль: 1-156.
- Варенцов В.А. 1919. Некоторые сведения о фауне позвоночных Переславского уезда // Докл. Переславль-Залесского Науч. Просвет. общ-ва 7: 1-16.
- Волков С.В., Гринченко О.С., Конторщиков В.В., Свиридова Т.В., Смирнова Е.В. 1998. Новые данные по распространению и численности некоторых редких видов птиц в Московской и сопредельных областях // Редкие виды птиц Нечернозёмного центра России. М.: 55-59.

- Гладков Н.А., Птушенко Е.С. 1934. Опыт экологического анализа озёрной орнитофауны Переславского края (Ивановская промышленная область) // *Зоол. журн.* **13**, 2: 333-358.
- Голубев С.В. 2000. Ярославская область // *Ключевые орнитологические территории России. Т. 1. Ключевые орнитологические территории международного значения в Европейской России.* М.: 189-200.
- Голубев С.В. 2004. Птицы // *Красная книга Ярославской области.* Ярославль: 259-339.
- Голубев С.В. 2011. *Птицы Ярославской области и сопредельных территорий: история, современное состояние. Неворобьиные (Non-passeriformes).* Ярославль, 1: 1-684.
- Иовченко Н.П. 2004. Современное состояние бормотушки (*Hippolais caligata* Licht.) на Северо-Западе России и возможные причины расширения её ареала // *Птицы и млекопитающие Северо-Запада России (эколого-фаунистические исследования).* СПб.: 84-98.
- Иовченко Н.П. 2010. Гнездование северной бормотушки *Hippolais caligata* в Ярославской области и некоторые проблемы изучения изменений ареалов // *Рус. орнитол. журн.* **19** (610): 1999-2009.
- Калякин М.В., Волцит О.В. (сост.). 2008. *Птицы Москвы и Подмосковья – 2005.* М.: 1-179.
- Птушенко Е.С. 1937. Наблюдения над миграциями птиц в окрестностях Плещеева озера в 1931–1935 годах // *Учён. зап. Моск. ун-та* **11**: 23-25.
- Птушенко Е.С., Гладков Н.А. 1933. Материалы к познанию орнитофауны Ивановской области (список птиц Переславщины) // *Бюл. МОИП. Нов. сер. Отд. биол.* **42**, 2: 199-213.
- Птушенко Е.С., Иноземцев А.А. 1968. *Биология и хозяйственное значение птиц Московской области и сопредельных территорий.* М.: 1-462.
- Равкин Е.С., Челинцев Н.Г. 1990. *Методические рекомендации по комплексному маршрутному учёту птиц.* М.: 1-33.
- Свиридова Т.В., Гринченко О.С. 2012. Гнездование кулика-сороки в сельскохозяйственных угодьях северо-востока Московской области // *Бюл. МОИП. Отд. биол.* **117**, 6: 21-24.
- Степанян Л.С. 2003. *Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области).* М.: 1-808.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2014, Том 23, Экспресс-выпуск 973: 633-634

Зимняя встреча синей птицы *Morphnus coeruleus* в заповеднике Аксу-Джабаглы

А.Ф.Ковшарь

*Второе издание. Первая публикация в 1991**

В заповеднике Аксу-Джабаглы, на ручье Байбарак, в 100 м от впадения в реку Джабаглы 3 ноября 1990 года встречена одна синяя птица

* Ковшарь А.Ф. 1991. Краткие сообщения о синей птице [Чимкентская область] // *Редкие птицы и звери Казахстана.* Алма-Ата: 255-256.

Myorhonus coeruleus около пустого гнезда, располагавшегося на маленькой скале в 2.5 м от земли. Здесь же одна особь держалась 10 и 11 февраля 1991.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2014, Том 23, Экспресс-выпуск 973: 634

Нахождение синей птицы *Myorhonus coeruleus* в ущельях северного склона Киргизского Алатау (Южный Казахстан)

В.Г.Колбинцев

Второе издание. Первая публикация в 1991*

В хребте Киргизский Алатау в ущелье Мерке 12-13 апреля 1984 держалось 3 пары синих птиц *Myorhonus coeruleus*. В ущельях Шыбынды, Сулутор, Туюктор и Кокбулак, расположенных к югу от села Акыртюбе (Луговской район Джамбулской области) в июне-августе 1986 года обитали и, очевидно, гнездились соответственно 1, 2, 4 и 2 пары.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2014, Том 23, Экспресс-выпуск 973: 634-635

Замечание к статье С.Л.Волкова «Пролёт птиц в долине реки Витим в 2012 году» в Амурском зоологическом журнале

С.Л.Волков

Сергей Леонидович Волков. ФГБУ Государственный природный заповедник «Витимский»; ул. Иркутская, 4а, г. Бодайбо, Иркутская область, 666902. E-mail: oropendola@yandex.ru

Поступила в редакцию 26 февраля 2014

В статье «Пролёт птиц в долине реки Витим в 2012 году» (Волков 2013) для краснозобой гагары *Gavia stellata* указано, что она отмечена в Витимском заповеднике впервые, что следует считать ошибочным. Уже после выхода журнала из печати автору стала известна статья

* Колбинцев В.Г. 1991. Краткие сообщения о синей птице [Джамбулская область]
// Редкие птицы и звери Казахстана. Алма-Ата: 256.

Ю.И.Мельникова (2000), где дано указание на несколько встреч в Витимском заповеднике выводков краснозобой гагары в 1985 и 1989 годах. К сожалению, сведения об этих наблюдениях в «Летописи природы» Витимского заповедника отсутствуют.

Л и т е р а т у р а

Волков С.Л. 2013. Пролёт птиц в долине реки Витим в 2012 году // *Амур. зоол. журн.* **5**, 3: 332-348.

Мельников Ю.И. 2000. О южной границе ареала краснозобой гагары *Gavia stellata* в Восточной Сибири // *Рус. орнитол. журн.* **9** (94): 19-22.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2014, Том 23, Экспресс-выпуск 973: 635-637

Зимняя встреча озёрной чайки *Larus ridibundus* на реке Каратал в окрестностях Талдыкоргана (Юго-Восточный Казахстан)

Н.Н.Березовиков, А.И.Беляев

Николай Николаевич Березовиков. Лаборатория орнитологии и герпетологии, Институт зоологии, Министерство образования и науки, проспект Аль-Фараби, д. 93, Алматы, 050060, Казахстан.
E-mail: berezovikov_n@mail.ru

Александр Иванович Беляев. Лаборатория эпизоотологии и профилактики, Талдыкорганская противочумная станция Министерства здравоохранения, ул. Таулсыздык, д. 104, Талдыкорган, 040000, Казахстан

Поступила в редакцию 19 февраля 2014

В северных предгорьях Джунгарского Алатау на незамерзающем русле реки Каратал в окрестностях города Талдыкорган (Алматинская область) 16 февраля 2014 наблюдалась одиночная озёрная чайка *Larus ridibundus* в зимнем наряде (см. рисунок). Эта встреча оказалась необычной для этих мест, потому что в предыдущие две зимы их здесь ни разу не встречали.

В Илийской долине и на Алаколь-Сасыккольской системе озёр озёрные чайки стали всё чаще стали задерживаться во время осенней миграции до конца ноября и первых чисел декабря, чему способствовали затяжные осенние сезоны и аномально поздние, с задержкой на месяц и более, сроки наступления зимних условий. Вместе с чайками-хохотуньями *Larus cachinnans* озёрные чайки встречаются в отдельные годы вплоть до замерзания водоёмов. Так, на Сорбулаке и Жаманкуме в 70 км севернее Алматы это явление стало впервые отмечаться в 1978-1983 годах, вскоре после ввода в строй системы сточных озёр-отстойников (Ерохов 1986). В прошедшем десятилетии наиболее

поздние встречи одиночных озёрных чаек здесь регистрировались накануне ледостава – 12 декабря 2004 и 22 декабря 2007 (Белялов, Карпов 2012), а на Капчагайском водохранилище в устье реки Тургень трёх задержавшихся *L. ridibundus* видели 3 декабря 2008 (Бевза 2011).



Озёрная чайка *Larus ridibundus* на реке Каратал. 16 февраля 2014. Талдыкорган. Фото А.И.Беляева.

Предполагалось, что подобные задержки неизбежно приведут к тому, что озёрные чайки станут оставаться на юго-востоке Казахстана на зимовку, как это уже случилось с более устойчивой к холодам сизой чайкой *Larus canus*, которая после зимы 2001/02 года стали регулярно зимовать в Илийской долине (Ерохов, Березовиков 2003), несмотря на то, январские и февральские вторжения арктических антициклонов почти каждый год неизменно приводило к замерзанию озёр и откочёвке к югу оставшихся на них многих видов водяных птиц. Зима 2013/14 года была гораздо мягче по сравнению с предыдущими, так как в январе не было традиционных крещенских морозов, чаще всего создававших экстремальные ситуации для водоплавающих и околоводных птиц. Первая половина февраля характеризовалась понижением ночных температур от минус 18 до минус 22°C, а в дневное время чаще всего в пределах -10...-15°C. Резкое потепление до +5°C началось 17-19 февраля. Вероятнее всего, встреченная чайка перезимовала где-то на незамерзающих участках рек, оросительных и сточных каналов или около городских свалок в пределах Алматинской области. Ближайшие места её зимовок находятся на озере Иссык-Куль, Чардаринском водохранилище и Шошкалиных озёрах в среднем течении Сырдарьи (Ерохов и др. 2004; Solocha 2006; Коваленко, Кравченко 2006; Коваленко, Карпов 2007).

Литература

- Бевза И.А. 2011. Материалы по фауне и биологии птиц урочища Карачингиль (устье р. Тургень в среднем течении р. Или) // *Selevinia*: 127-151.
- Белялов О.В., Карпов Ф.Ф. 2012. Птицы Сорбулакской системы озёр (Алматинская область) // *Selevinia*: 82-108.
- Ерохов С.Н. 1986. *Формирование и динамика орнитофауны сточных водоёмов-накопителей в пустынной зоне юго-востока Казахстана*. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. М.: 1-22.
- Ерохов С.Н., Березовиков Н.Н. 2003. О формировании зимовок сизой чайки *Larus capus* на водоёмах юго-востока Казахстана // *Рус. орнитол. журн.* **12** (235): 983-985.
- Ерохов С.Н., Белялов О.В., Карпов Ф.Ф. 2004. Численность водоплавающих птиц в период зимовки на водоёмах Алматинской и Южно-Казахстанской областей в 2004 г. // *Каз. орнитол. бюл.* **2004**: 51-52.
- Коваленко А.В., Карпов Ф.Ф. 2007. Обследование мест зимовок на Шардаринском водохранилище в январе 2007 г. // *Каз. орнитол. бюл.* **2007**: 54-55.
- Коваленко А.В., Кравченко С.А. 2006. Обследование мест зимовок водоплавающих птиц в Южно-Казахстанской области в феврале 2006 г. // *Каз. орнитол. бюл.* **2006**: 49-53.
- Solokha A. 2006. *Results from International Waterbird Census in Central Asia and the Caucasus 2003-2005*. Moscow: 1-73.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2014, Том 23, Экспресс-выпуск 973: 637

Летние находения савки *Oxyura leucoserphala* в низовьях Тургая (Актюбинская область)

В.Г.Березовский

Второе издание. Первая публикация в 1991*

На озере Кармакколь в низовьях реки Тургай 5 июля 1975 отмечены две савки *Oxyura leucoserphala* в стае с нырковыми утками, а 26 июля 1975 в 16 км севернее озера Жаньыс в центре водоёма у тростникового купака наблюдали двух савок среди других уток.



* Березовский В.Г. 1991. Краткие сообщения о савке [Актюбинская область] // *Редкие птицы и звери Казахстана*. Алма-Ата: 91.