ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал

2015
XXIV

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
1106
EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXIV

Экспресс-выпуск • Express-issue

2015 № 1106

СОДЕРЖАНИЕ

499-505 Южнополярный поморник *Catharacta maccormicki* в районе станции Мирный (Антарктида) в 2009-2010 годах. И.А.МИЗИН

506-507 Рябинник *Turdus pilaris* – новый вид орнитофауны Сахалинской области. С.Н.АББАКУМОВ, Г.Н.СМЕКАЛОВ

508-510 Массовая зимовка рябинника *Turdus pilaris* в 2014/15 году в Архангельске. В.А.АНДРЕЕВ

510-511 Встреча зимующего поползня *Sitta europaea* в низовьях реки Сясь. В.М.ПОЛЯКОВ, А.В.БАРДИН

512-513 Новый залёт кудрявого пеликана *Pelecanus crispus* на Шульбинское водохранилище. А.С.ФЕЛЬДМАН, Н.Н.БЕРЕЗОВИКОВ

514 Ещё один залёт огаря *Tadorna ferruginea* в Томскую область. В.С.ЖУКОВ

515-516 Гнездование горихвостки-чернушки *Phoenicurus ochruros* и чижа *Spinus spinus* в Окском заповеднике. В.П.ИВАНЧЕВ

517-519 Новые птицы поймы Орели. А.Н.ГУДИНА

519 Летнее нахождение филина *Bubo bubo* в пойме реки Урал у села Коловёртное. В.В.НЕРУЧЕВ

Редактор и издатель А.В.Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

© Русский орнитологический журнал, 2015
Дата опубликования: 8 февраля 2015

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Published from 1992

Volume XXIV
Express-issue

2015 № 1106

CONTENTS

499-505 The south polar skua *Catharacta maccormicki* near Mirny station (Antarctica) in 2009-2010. I.A.MIZIN

506-507 The fieldfare *Turdus pilaris* – a new species of avifauna of Sakhalin Oblast. S.N.ABBAKUMOV, G.N.SMEKALOV

508-510 Mass wintering of the fieldfare *Turdus pilaris* in 2014/15 in Arkhangelsk. V.A.ANDREEV

510-511 The record of wintering nuthatch *Sitta europaea* in the lower reaches of the Syas River. V.M.POLYAKOV, A.V.BARDIN

512-513 New record of vagrant Dalmatian pelican *Pelecanus crispus* on Shulba Reservoir. A.S.FELDMAN, N.N.BEREZOVIKOV

514 Another record of the ruddy shelduck *Tadorna ferruginea* in the Tomsk Oblast. V.S.ZHUKOV

515-516 Breeding of the black redstart *Phoenicurus ochruros* and siskin *Spinus spinus* in the Oka Reserve. V.P.IVANCHEV

517-519 The new birds of Orel floodplain. A.N.GUDINA

519 Summer record of the eagle owl *Bubo bubo* in the floodplain of the Ural River near the village of Kolovertnoe. V.V.NERUCHEV

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

© The Russian Journal of Ornithology, 2015

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1106**: 499-505*

Южнополярный поморник *Catharacta maccormicki* в районе станции Мирный (Антарктида) в 2009-2010 годах

И.А.Мизин

Иван Андреевич Мизин. ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика»,
проспект Советских Космонавтов, д. 57, Архангельск, 163000, Россия. E-mail: Ivan_Mizin@mail.ru

Поступила в редакцию 21 января 2015

Южнополярный поморник *Catharacta maccormicki* – обычная птица района архипелага Хасуэлл (Короткевич 1958). Во время работы 54-й Российской антарктической экспедиции были проведены наблюдения за локальной популяцией вида в указанном районе и предпринята попытка определить численность гнездящейся группировки вида на островах архипелага.

Учёты поморников на гнёздах проводились 3-4 декабря 2009 и 15-17 января 2010. Промеры птиц и их яиц производились с помощью деревянной линейки (50 см) и штангенциркуля (рис. 1).

Рис. 1. Измерение яиц южнополярного поморника *Catharacta maccormicki*.
Остров Хасуэлл, 3 декабря 2009. Фото Д.Смирнова.

В 2009 году южнополярные поморники покинули станцию 10 апреля. Прилёт первых птиц был зафиксирован 11 октября. Первый выводок отмечен на острове Хасуэлл 22 декабря (в 2 гнёздах было по 2

птенца), вылупление началось, скорее всего, 18-19 декабря. 17 января в некоторых гнёздах ещё были яйца. Удалось идентифицировать 19 птиц, окольцованных в прошлые экспедиции (табл. 1).

Таблица 1. Повторные регистрации южнополярных поморников *Catharacta maccormicki* в декабре 2009 и январе 2010 года

№	№ кольца	Когда и где окольцован
1	Capetown 871102	Декабрь 2006 г., Мирный
2	8 71104	Декабрь 2006 г., Мирный
3	8 71107	Декабрь 2006 г., Мирный
4	8 71125	Декабрь 2006 г., Мирный
5	8 71111	Декабрь 2006 г., Мирный
6	8 71113	Декабрь 2006 г., Мирный
7	8 71115	Декабрь 2006 г., Мирный
8	8 71116	Декабрь 2006 г., Мирный
9	8 71124 (+сине-зелёный пластик)	Не определено
10	Pretoria 8 57211	Ноябрь 2000 г., Мирный
11	57213 (красный пластик)	Ноябрь 2000 г., Мирный
12	57218	Ноябрь 2000 г., Мирный
13	57220 (жёлтый пластик)	Ноябрь 2000 г., Мирный
14	57232	Декабрь 2000 г., Мирный
15	57239 (красный пластик)	Декабрь 2000 г., Мирный
16	57245	Декабрь 2000 г., Мирный
17	57250	Декабрь 2000 г., Мирный
18	Paris museum DZ 21727 и J 72 (белый большой пластик)	Не определено

Рис. 2. Окольцованный южнополярный поморник *Catharacta maccormicki*. 9 января 2010. Фото автора.

Рис. 3. Гнездо южнополярного поморника *Catharacta maccormicki* на острове Горева.

Рис. 4. Птенцы южнополярного поморника *Catharacta maccormicki*.
Остров Хасуэлл, 17 января 2010.

В течение ноября-декабря 2010 года ещё 20 южнополярных поморников были окольцованы кольцами с номерами 857131-857150, а после того, как кольца этой серии закончились, один поморник был окольцован меньшим по диаметру кольцом московского центра кольцевания S 003699, а ещё 4 – пластиковыми кольцами C 17, 21, 26, A 86. Все птицы также кольцевались синими пластиковыми кольцами (рис. 2).

В декабре и январе (с повтором) проведены учёты поморников на гнездах (рис. 3), причём в январе было насчитано в два раза больше гнёзд. Всего на 17 января на острове Хасуэлл зарегистрировано 50 гнёзд южнополярного поморника. В 43 гнёздах находились птенцы: в 3 – по 2 птенца, в остальных – по одному. В 7 гнёздах были яйца: в 4 – по 2, в 3 – по 1 яйцу. Всего 46 птенцов и 11 яиц. В 9 гнёздах птенцы были крупные, у них отрастали маховые перья (рис. 4).

Размеры яиц (n =73), мм: 48.3-54.4×67.6-78.9, в среднем 51.6×72.0.

Можно отметить, что повторная кладка происходит у поморников в южной части острова, тогда как на северной в середине января отмечено только одно гнездо с яйцами. Повторная кладка отмечена у 6 пар. Величина группировки южнополярных поморников в гнездовой сезон 2009/10 года составила 62 гнездящиеся пары (табл. 2), а также примерно 40-50 неразмножающихся птиц (рис. 5), всего – около 170 особей.

Рис. 5. Группа неразмножающихся южнополярных поморников *Catharacta maccormicki* на острове Хасуэлл, 29 декабря 2009.

Распределение гнёзд южнополярного поморника и других гнездящихся видов острова Хасуэлл как основного локального местообитания приведено на рисунке 6.

Для морфометрических измерений и кольцевания отловили 39 поморников (8 из них были окольцованы в 2000 году), ещё 2 птицы измерены *post mortem*. Результаты измерений и взвешивания приведены в таблице 3. Окраска большинства *C. maccormicki* была типичной для вида. Лишь 2 птицы имели более тёмный цвет оперения с заметным золотистым «ожерельем» на шее. Одна не размножавшаяся пара состоя-

Таблица 2. Размещение гнёзд южнополярного поморника *Catharacta maccormicki* на островах архипелага Хасуэлл

Остров архипелага	Число найденных гнёзд в 2009/10 году	Число найденных гнёзд в 1957 году
Хасуэлл	50	35
Буромского	1	1
Зыкова	3	3
Фулмар	3	3
Строителей	1	2
Токарева	2	4
Горева	1	1
Порядина	1	1
Всего	62	50



Рис. 6. Размещение гнездящихся птиц на острове Хасуэлл.

ла из птиц тёмной и светлой морф (рис.7). Кроме южнополярных поморников, на острове Хасуэлл и территории станции весь летний период держался крупный поморник с очень тёмным контрастным оперением. Он держался несколько поодаль от остальных, не принимал участие в стычках других поморников за пищу. Эта птица отловлена

на льду 10 января 2010, окольцована жёлтым пластиковым кольцом № С 28. Во время отлова, отбора крови и измерений вела себя очень спокойно. Определена как субантарктический поморник *Catharacta antarctica* (рис. 8).

Рисунок 7. Южнополярные поморники *Catharacta maccormicki* с разным цветом оперения. 17 января 2010.

Рис. 8. Субантарктический поморник *Catharacta antarctica*. 10 января 2010.

Таблица 3. Размеры поморников (средние значения и lim)

Параметр	*Catharacta maccormicki* *n* = 41,	*Catharacta antarctica* *n* = 1
Длина головы, мм	108.61 (102.8–115)	121.3
Длина клюва по коньку, мм	46.75 (43.2–51.9)	52.6
Высота клюва, мм	18.05 (16.9–19)	21.1
Длина цевки, мм	68.06 (60.9–72.7)	77.2
Длина хвоста, мм	164.95 (142–200)	200.0
Длина крыла, мм	408.54 (390–425)	430.0
Масса тела, г	1464.10 (1250–1700)	2200.0

Рис. 9. Поморники на свалке пищевых отходов станции Мирный. 1 февраля 2010.

Население южнополярного поморника в исследованном районе достаточно стабильно. Общая численность в гнездовой сезон 2009/10 года составила не менее 170 особей, в том числе 62 гнездовые пары. Кроме южнополярного, отмечено присутствие субантарктического поморника. Со времени первых зоологических наблюдений на архипелаге Хасуэлл (Короткевич 1959) численность южнополярных поморников возросла. Для кормёжки они используют как колонии пингвинов Адели *Pygoscelis adeliae*, так и свалку пищевых отходов станции (рис. 9).

Литература

Короткевич Е.С. 1958. Наблюдения над птицами во время первой зимовки Советской антарктической экспедиции в 1956-1957 гг. // *Информ. бюл. Советской антарктической экспедиции* **3**: 83-87.

Короткевич Е.С. 1959. Птицы Восточной Антарктиды // *Проблемы Арктики и Антарктики* **1**: 95-107.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1106**: 506-507*

Рябинник *Turdus pilaris* – новый вид орнитофауны Сахалинской области

С.Н.Аббакумов, Г.Н.Смекалов

Сергей Николаевич Аббакумов. Ул. Больничная, д. 36, кв. 210, Южно-Сахалинск, 693013, Россия. E-mail: sabbakumov@bk.ru
Григорий Николаевич Смекалов, краевед. Ул. Лермонтова, д. 12 , кв.1, Александровск-Сахалинский, 694420, Россия. E-mail: gsmekalov@yandex.ru

Поступила в редакцию 7 февраля 2015

В литературе нами не найдено упоминаний о встречах рябинника *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758) на территории Сахалинской области (Нечаев 1991, 2005; Нечаев, Гамова 2009). В последние годы этот вид впервые отмечен на пролёте в долине Верхней Колымы в сентябре 2009 года (Андреев и др. 2011) и на охотоморском побережье в окрестностях Магадана 5 сентября 2009 (И.В.Дорогой, устн. сообщ.). Также нам известно о встрече двух одиночек в Комсомольске-на-Амуре в марте и начале апреля 2010 года (снимки публиковались на форуме сайта СОПР и в соц. сетях*) (Н.Г.Логинов, устн. сообщ.). Гнездование вида на Дальнем Востоке впервые установлено в 2014 году в Ольском районе Магаданской области (Кондратьев 2014).

Рис. 1. Рябинник *Turdus pilaris*. Александровск-Сахалинский, 2 февраля 2015. Фото Г.Н.Смекалова.

1 февраля 2015 Г.Н.Смекалов сфотографировал необычного дрозда в городе Александровске-Сахалинском. Качество изображения не поз-

* https://fotki.yandex.ru/users/loghinov15/album/211673/

волило сделать однозначный вывод о видовой принадлежности птицы. Первоначальная версия, что это рябинник, подтвердилась серией снимков, отснятой 2 февраля (рис. 1 и 2). Птица держалась в черте города рядом со стаей обыкновенных свиристелей *Bombycilla garrulus*, которые сидели на яблоне и клевали плоды. 2 февраля 2015 рябинник держался в одиночку, подбирая упавшие на снег яблоки. На этом же участке птица была отмечена и 5 февраля.

Рис. 2. Рябинник *Turdus pilaris* ищет в снегу плоды яблони.
Александровск-Сахалинский, 2 февраля 2015. Фото Г.Н.Смекалова.

Таким образом, рябинника можно считать новым залётным и зимующим видом Сахалинской области.

Литература

Андреев А.В., Кречмар А.В., Утехина И.Г. 2011. Птицы // *Растительный и животный мир заповедника «Магаданский»*. Магадан: 129-155.

Кондратьев А.В. 2014. Первый случай гнездования рябинника *Turdus pilaris* в Магаданской области // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1045): 2785-2787.

Нечаев В.А. 1991. *Птицы острова Сахалин*. Владивосток: 1-748.

Нечаев В. А. 2005. Обзор фауны птиц (Aves) Сахалинской области // *Растительный и животный мир острова Сахалин (Материалы Международного сахалинского проекта)*. Часть 2. Владивосток: 246-327.

Нечаев В.А., Гамова Т.В. 2009. *Птицы Дальнего Востока России (аннотированный каталог)*. Владивосток: 1-564.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1106**: 508-510*

Массовая зимовка рябинника *Turdus pilaris* в 2014/15 году в Архангельске

В.А.Андреев

Валерий Аркадьевич Андреев. Кафедра зоологии и экологии, Северный (Арктический) федеральный университет, пр. Ломоносова, 4, Архангельск, 163002, Россия.
E-mail: vandreev@atnet.ru

Поступила в редакцию 6 февраля 2015

Более чем за 34 лет орнитологических наблюдений в Архангельске было отмечено всего несколько встреч рябинника *Turdus pilaris* зимой, в декабре-феврале (Андреев 2014). Несколько встреч зарегистрировано также в марте и ноябре – месяцах, которые в Архангельске можно отнести к зимнему периоду. Причём во всех этих случаях наблюдались одиночные птицы.

Постоянные круглогодичные учёты численности птиц в течение последних 15 лет (проведено 3600 учётов, пройдено 10800 км) показали, что среднегодовая плотность населения рябинника за все годы составила 32.9 ос./км^2. Среднемесячная за все годы плотность населения в зимние месяцы не превышала 0.4 ос./км^2. Наибольшая плотность населения рябинника регистрировалась в осенние месяцы – сентябре (в среднем за все годы 96.8 ос./км^2) и октябре (85.5 ос./км^2).

Рис. 1. Рябинник *Turdus pilaris*, поедающий плоды рябины *Sorbus aucuparia*. Архангельск, 25 января 2015. Фото автора.

В 2014 году плотность населения рябинника в сентябре составила 15.6, в октябре – 2.5 ос./км^2. Такую низкую осеннюю численность этого

вида можно объяснить длительными мощными майскими снегопадами, приведшими к массовой гибели птиц, и, следовательно, к невысокому успеху размножения. В ноябре и декабре 2014 года население рябинника увеличилось до 5.6 и 7.1 ос./км^2, соответственно, а в январе 2015 года (29 учётов) оно составило 35.5 ос./км^2, превысив ранее зарегистрированную плотность этого вида в январе почти в 90 раз. Таким образом, зимой 2014/15 года в Архангельске на зимовку остались тысячи рябинников (по моей оценке – более 10 тыс. особей).

Рис. 2. Рябинник *Turdus pilaris* на яблоне ягодной *Malus baccata* 25 января 2015. Температура воздуха минус 2ºС. Архангельск. Фото автора.

Рис. 3. Рябинник *Turdus pilaris* на рябине. 11 января 2015. Температура воздуха минус 31ºС (вокруг глаз и клюва заметен иней). Архангельск. Фото автора.

Такая массовая зимовка рябинника наблюдалась в Архангельске впервые и стала возможной благодаря небывалому урожаю рябины *Sorbus aucuparia*. Её плоды остались висеть на деревьях до середины зимы, чего ранее никогда не случалось: вся рябина обычно съедалась птицами ещё до начала зимы.

К середине зимы 2014/15 года многотысячные стаи свиристелей *Bombycilla garrulus* и небольшие стайки рябинников (до 50-100 птиц) съели бóльшую часть урожая рябины, и дрозды начали переключаться на поедание плодов черноплодной рябины *Aronia melanocarpa* и ягодной яблони *Malus baccata* (рис. 2).

При поедании ягод зимой при температуре воздуха от минус 2° до минус 31°С рябинники, державшиеся поодиночке, подолгу сидели на деревьях или кустах неподвижно, склёвывая за несколько минут по одной ягоде (рис. 1, 3). По-видимому, малая подвижность позволяет птицам экономить энергию. Находясь в стаях, дрозды клевали ягоды с большей частотой и подолгу на деревьях не засиживались.

Литература

Андреев В.А. 2014. Новые регистрации птиц на зимовке в Архангельске // *Рус. орнитол. журн.* **23** (980): 902-905.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1106**: 510-511*

Встреча зимующего поползня *Sitta europaea* в низовьях реки Сясь

В.М.Поляков, А.В.Бардин

Вадим Михайлович Поляков. SPIN-код: 2693-7255. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. E-mail: vadim-m-polyakov@ya.ru

Александр Васильевич Бардин. SPIN-код: 5608-1832. Кафедра зоологии позвоночных, биологический факультет, Санкт-Петербургский государственный университет, Университетская набережная, 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия. E-mail: ornis@mail.ru

Поступила в редакцию 10 декабря 2014

По Ленинградской области проходит северная граница распространения поползня *Sitta europaea*, но обозначить её пока можно лишь приблизительно (Бардин 1983). Из районов севернее Невы и восточнее Волхова до сих пор очень мало сведений об этом виде, поэтому новые его местонахождения представляют большой интерес.

8 декабря 2013 самец поползня (см. рисунок) наблюдался в низовьях реки Сясь – на краю города Сясьстроя, в лесополосе на правом

берегу реки (60°08.4' с.ш., 32°31.5' в.д.). Держался в одиночку. Как видно на фотографии, он нашёл на стволе сосны семя подсолнечника, очевидно, запасённое им с прикормки.

Поползень *Sitta europaea*. Сясьстрой, 8 декабря 2013. Фото В.Полякова.

Как показали наблюдения за окольцованными поползнями, проведённые в окрестностях города Печоры Псковской области, зимой эти птицы ведут строго оседлый образ жизни. Молодые после распадения выводков широко расселяются и уже в июле оседают на постоянных участках обитания, образуя пары. Всю осень и зиму они проводят на территориях площадью 20-30 га, на каждой из которых живут только два или один поползень. Во второй половине февраля начинаются весенние перемещения молодых птиц (старые строго оседлы), в ходе которых многие молодые пары распадаются и особи покидают свои зимние участки обитания (Бардин 2006). Поэтому сам факт зимовки ещё не означает, что поползни будут гнездиться в данном районе.

Литература

Бардин А.В. 1983. Семейство поползни – Sittidae // А.С.Мальчевский, Ю.Б.Пукинский. Птица Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана. Л., 2: 299-304.

Бардин А.В. 2006. О территориальном поведении поползня *Sitta europaea* в Псковской области // *Рус. орнитол. журн.* 15 (306): 24-27.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1106**: 512-513*

Новый залёт кудрявого пеликана *Pelecanus crispus* на Шульбинское водохранилище

А.С.Фельдман, Н.Н.Березовиков

Александр Сергеевич Фельдман. Средняя школа № 28, г. Семей, Восточно-Казахстанская область, 071400, Казахстан. E-mail: papafe@mail.ru
Николай Николаевич Березовиков. Отдел орнитологии и герпетологии, Институт зоологии, Министерство образования и науки, проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан. E-mail: berezovikov_n@mail.ru

Поступила в редакцию 18 января 2015

Основными местами обитания кудрявого пеликана *Pelecanus crispus* в бассейне Верхнего Иртыша на востоке Казахстана в настоящее время являются озеро Зайсан и Бухтарминское водохранилище (Березовиков и др. 1995; Щербаков 2014). Случаи их залётов вниз по Иртышу к Усть-Каменогорску, Семипалатинску и Павлодару всегда были исключительно редки (Селевин 1927, 1935; Хахлов, Селевин 1928; Долгушин 1960), при этом во второй половине XX столетия вообще не отмечались.

Рис. 1. Иртыш ниже плотины Шульбинской ГЭС. 23 сентября 2012. Фото А.С.Фельдмана.

Первое появление одного кудрявого пеликана на Шульбинском водохранилище наблюдалось 10-20 августа 2012 (Березовиков 2013).

Новый залёт зарегистрирован 28 апреля 2014, когда одиночный кудрявый пеликан появился и весь день держался на Иртыше ниже плотины Шульбинской ГЭС у посёлка Шульбинск (рис. 1 и 2). Этот участок реки ниже турбин ГЭС в последние годы стало привлекательным местом кормёжки рыбоядных птиц, особенно больших бакланов *Phalacrocorax carbo* и хохотуний *Larus cachinnans*.



Рис. 2. Кудрявый пеликан *Pelecanus crispus* на Иртыше ниже плотины Шульбинской ГЭС. 28 апреля 2014. Фото А.С.Фельдмана.

Литература

Березовиков Н.Н. 2013. Шульбинское водохранилище – новый очаг гнездования водоплавающих и околоводных птиц в бассейне Верхнего Иртыша // *Рус. орнитол. журн.* **22** (873): 1121-1129.

Березовиков Н.Н., Стариков С.В., Щербаков Б.В. (1995) 2011. Кудрявый *Pelecanus crispus* и розовый *P. onocrotalus* пеликаны в Зайсанской котловине // *Рус. орнитол. журн.* **20** (683): 1703-1707.

Долгушин И.А. 1960. *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, **1**: 1-470.

Селевин В.А. 1927. О залётах пеликанов на среднее течение Иртыша в приалтайскую степь // *Uragus* 3: 32-33.

Селевин В.А. 1935. Новые данные по распространению птиц в Западном Алтае и его предгорьях // *Бюл. Среднеаз. ун-та* 21 (13): 115-126.

Хахлов В.А., Селевин В.А. 1928. Список птиц окрестностей Семипалатинска // *Uragus* 2 (7): 19-34.

Щербаков Б.В. 2014. Колония кудрявого пеликана *Pelecanus crispus* на Батинских островах Бухтарминского водохранилища // *Рус. орнитол. журн.* **23** (1073): 3698-3700.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1106**: 514*

Ещё один залёт огаря *Tadorna ferruginea* в Томскую область

В.С.Жуков

Виктор Семёнович Жуков. ФГБУН Институт систематики и экологии животных СО РАН, ул. Фрунзе, д. 11, Новосибирск, 630091, Россия. E-mail: vszhukov1955@mail.ru

Поступила в редакцию 7 февраля 2015

Одиночный огарь *Tadorna ferruginea* наблюдался 12 июля 1975 в окрестностях села Половинка, что на правом берегу Оби в Томском районе (56°42′ с.ш., 84°23′ в.д.). Птица летела на высоте около 30 м над рекой вверх по течению, т.е. примерно на юго-запад, т.к. в этом месте Обь течёт с юго-запада на северо-восток. В списке птиц Томской области, составленном Т.К.Блиновой и М.М.Мухачевой (2002), огарь уже значится как залётный вид. Залёты огарей известны для окрестностей Томска и села Казальцево на Оби в Каргасокском районе (59°15′ с.ш., 80º32′ в.д.) (Гынгазов, Миловидов, 1977). Севернее по Оби отмечены регулярные залёты этого вида на участке Двуобья (Шурышкарский и Приуральский районы Ямало-Ненецкого автономного округа) (65º22-57′ с.ш., 64º42′-65º54′ в.д.) (Локтионов, Пилипенко, Яковлев 2007). Известны случаи залётов огарей ещё дальше к северу, вплоть до тундры (Рябицев 2008).

Литература

Блинова Т.К., Мухачева М.М. 2002. *Птицы Томской области: история изучения и библиографический указатель (1879-2001)*. Томск: 1-116.

Гынгазов А.М., Миловидов С.П. 1977. *Орнитофауна Западно-Сибирской равнины*. Томск: 1-350.

Локтионов Е.Ю., Пилипенко Д.В., Яковлев А.А. 2007. Птицы Приобской северной тайги // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири*. Екатеринбург: 144-182.

Рябицев В.К. 2008. *Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: справочник-определитель*. Екатеринбург: 1-634.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1106**: 515-516*

Гнездование горихвостки-чернушки *Phoenicurus ochruros* и чижа *Spinus spinus* в Окском заповеднике

В.П.Иванчев

*Второе издание. Первая публикация в 1987**

Горихвостка-чернушка *Phoenicurus ochruros* (самец) впервые для Окского заповедника была отмечена К.Д. Зыковым 18 апреля 1963 в посёлке. Ю.Н.Киселёв (1978) также наблюдал самца чернушки 1 апреля 1975 и 24 марта 1981. 16 апреля 1984 поющий самец отмечен на центральной усадьбе заповедника в посёлке Брыкин бор. Всю весну и лето птица постоянно держалась среди хозяйственных построек на участке диаметром 150-200 м. Гнёзд обнаружено не было.

19 июля 1984 в посёлке в 200 м от места постоянного нахождения встречена пара чернушек, беспокойно перелетающих с места на место. Здесь же обнаружен слёток. На голове у него были заметны остатки эмбрионального пуха, хвост достиг приблизительно 1/2 дефинитивной величины. Взрослые птицы собирали корм (иногда отлетали до 100 м в сторону) и кормили птенца. Птицы держались в этом месте до 25 июля, причём 22 июля при наблюдениях было замечено 2 птенца. Последний раз (26 июля) весь выводок был встречен в 250-300 м от места обнаружения.

Интересно отметить, что в это самое время самец чернушки продолжал петь в районе первой весенней встречи. Видимо, эта птица так и не приступала к размножению в том году. Последняя встреча горихвостки-чернушки в районе гнездования отмечена 4 октября 1984.

Таким образом, гнездование горихвостки-чернушки для Окского заповедника можно считать установленным. Гнездование чернушки в Окском заповеднике представляет интерес и в другом отношении, так как это преимущественно горная птица и обычно гнездовыми станциями для неё являются скалистые или каменистые склоны гор. В зоне расселения эта птица чаще всего гнездится в городах в районах многоэтажных новостроек (Белик 1977; Водолажская 1981; наши наблюдения). Центральная усадьба Окского заповедника расположена в высокоствольном сосновом бору, жилые дома и хозяйственные постройки преимущественно деревянные, и появление чернушки здесь на гнездовании не типично. В 1985 году чернушка не отмечалась.

---

* Иванчев В.П. Гнездование горихвостки-чернушки и чижа в Окском заповеднике // *Орнитология* **22**: 181-182.

Характер пребывания чижа *Spinus spinus* в Окском заповеднике во многом оставался неясным. Весьма обыкновенным он является в осеннее и весеннее время, в большом числе встречается и в некоторые зимы. В.С.Птушенко (1958), работавший в окрестностях заповедника в 1940-е годы, встречал чижа и летом. Отмечали эту птицу летом для Мещеры и более ранние исследователи. Многочисленным чиж был летом и в 1980-е годы. Так, в 1981 году в западной части заповедника в мае-июне мы неоднократно встречали в сосняках поющих самцов. Однако гнёзд до сих пор обнаружено не было.

В апреле 1985 года чижи в массе держались на центральной усадьбе заповедника, причём во многих местах явно сформировавшимися парами. 22 апреля гнездо чижа было найдено в тот момент, когда птицы его достраивали. Оно располагалось на сосне на высоте 3.8 м от земли на боковом суке дерева в 2 м от основного ствола. 28 апреля в нём находилось 5 яиц бело-голубоватого цвета (их размеры, мм: 16.7×13.0, 17.6×13.0, 17.2×13.0, 17.0×12.8 и 16.9×12.6). Гнездо построено в основном изо мха и собачьей шерсти, снаружи много веточек жимолости толщиной до 0.3 см. Лоток выстлан собачьей шерстью и конским волосом. Размеры гнезда, см: диаметр гнезда 8×8, диаметр лотка 5.5×5.5, высота гнезда 5, глубина лотка – 3. Кладку насиживала самка, подпуская наблюдателя на 1.5-2 м. 15 мая гнездо оказалось брошенным, а яйца неоплодотворёнными. Второе гнездо, найденное Ю.В.Котюковым 15 мая, также располагалось на боковом суке сосны в 3 м от основного ствола высоте приблизительно 10 м. В гнезде находилась самка. 29 мая оно было уже пустым.

Учитывая непостоянство гнездования в пределах ареала вообще и его зависимость от урожая хвойных (осенью 1984 года урожай сосны в Окском заповеднике определена в 3 балла по шкале Каппера-Формозова), чижа можно считать спорадически гнездящимся видом для Окского заповедника.

Литература

Белик В.П. 1977. Канареечный вьюрок и горихвостка-чернушка в Сумском Полесье // *Орнитология* **13**: 187-188.

Водолажская Г.И. 1981. Материалы по птицам города Казани // *Тез. докл. 8-й Всесоюз. орнитол. конф.* Кишинёв.

Киселёв Ю.Н. 1978. Горихвостка-чернушка (*Phoenicurus ochruros* Gm.) – новый вид орнитофауны Окского заповедника // *Тр. Окского заповедника* **14**: 361-362.

Птушенко Е.С. 1958. Список птиц Окского заповедника и Рязанской области // *Тр. Окского заповедника* **2**: 192-206.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1106**: 517-519*

Новые птицы поймы Орели

А.Н.Гудина

Второе издание. Первая публикация в 1987[*]

Пойма среднего течения Орели – естественная граница степной и лесостепной зон. Изучение орнитофауны проводили здесь в 1980-1983 годах. Найдено несколько видов, ранее не гнездившихся или в гнездовой период не отмечавшихся.

Красноносый нырок *Netta rufina*. В коллекции Музея природы Харьковского университета хранятся 5 экз. этого вида, добытых с 9 ноября по 3 января в бассейне Орели в 1915-1929 годах Н.И.Гавриленко. 20 мая 1982 пара красноносых нырков обнаружена на озере Куликово в Магдалиновском районе Днепропетровской области. Она держалась обособленно от обычных здесь красноголовых нырков *Aythya ferina*.

Озёрная чайка *Larus ridibundus*. Ранее на гнездовании была найдена лишь в старом устье Орели (Булахов, Мясоедова 1975). На гнездовании в среднем течении реки впервые обнаружена в 1980 году на озере Капинерное (Лисецкий и др. 1982). В 1981-1982 годах в этой колонии насчитывалось 30-50 гнёзд. В 1983 году в начале третьей декады апреля несколько пар приступили к постройке гнёзд, но вскоре гнёзда и большинство птиц исчезли по непонятной причине. Вторая колония найдена на озере Лисичье в Новомосковском районе Днепропетровской области (в 1982 году ~50, в 1983 – ~75 пар). В 1983 году на озере Горелое в том же районе найдена колония из 250 пар, существующая уже несколько лет, и на озере Займанский лиман в Зачепиловском районе Харьковской области (около 50 пар) – новая колония.

К настоящему времени озёрная чайка стала обычной гнездящейся птицей поймы Орели. Для гнездования избираются участки озёр глубиной до 1 м, поросшие камышом озёрным (на Займанском лимане доминируют рогозы). В самой молодой колонии на Займанском лимане обнаружено лишь одно гнездо черношейной поганки *Podiceps nigricollis*. Остальные колонии были смешанными. Гнезда чаек и поганок часто располагались вплотную друг к другу, а в 1983 году в колонии на Горелом озере найдено несколько смешанных кладок (в гнёздах обоих видов). На озере Капинерное в 1980 и 1982 годах осмотрено 15 гнёзд (диаметр гнезда 23.0-29.5 см, диаметр лотка 12.0-17.2 см, высота гнезда 8.0-23.0 см, глубина лотка 4.5-6.2 см). Размеры 23 яиц, мм: 46.9-54.75×33.1-38.3, в среднем 50.9×36.1. В 1980 году первый птенец на

[*] Гудина А.Н. 1987. Новые птицы поймы Орели // *Орнитология* **22**: 180-181.

Капинерном замечен 29 мая, а в 1983 году на Горелом озере во многих гнёздах птенцы появились уже 10 мая.

Белощёкая крачка *Chlidonias hybridus*. Единственный экземпляр был отмечен и добыт 22 июня 1897 в устье реки Орчик (приток Орели) Н.А.Зарудным (1911), который считал белощёкую крачку редким залётным видом данной местности. В 1980 году в 1 км от этого места нами найдена колония из 5 гнёзд – на озере Капинерное. В 1981 году в колонии насчитывалось 36 гнёзд. 1 июня 1982, когда гнездостроение ещё не закончилось, учтено 27 гнёзд (вместе с пустыми). В 1983 году гнездилось около 100 пар. Обособленная в 1980, в 1981 году эта колония территориально соединилась с колонией озёрной чайки. В 1981 году здесь начали гнездиться черношейные поганки (2 пары), гнёзд которых в 1983 году было более 45. В 1982 году найдены новые колонии белощёкой крачки – на озере Кривец в окрестности посёлка Перещепино (совместно с чёрной крачкой *Chlidonias niger)* и на озере Лисичье (совместно с озёрной чайкой). 4-5 июня здесь соответственно учтено 20 и 13 гнёзд, а 16 мая 1983 – 6 и 12 гнёзд. В 1983 году на озере Горелое 80 пар гнездились совместно с черношейными поганками. Начало кладки в 1980 году отмечено 20 июня (по 1 яйцу в 2 гнёздах). 10 июня 1983 во всех 3 гнёздах, найденных на Займанском лимане в колонии чаек, началось вылупление птенцов.

Желтоголовая трясогузка *Motacilla citreola*. 7 мая 1982 окольцован самец из пары, державшейся на берегу озера Капинерное. Здесь же 2 пары кормящих птиц встречены в конце мая 1983 года Е.В.Водолазским (устн. сообщ.).

Дрозд-рябинник *Turdus pilaris*. Впервые колонию этого вида из нескольких гнёзд обнаружили в мае 1980 года в пойменном лесу урочища Орчик Зачепиловского лесничества. В 1981 году найдена такая же колония в небольшой дубраве на берегу Орели в Магдалиновском районе Днепропетровской области. Одно гнездо 7 мая содержало полную кладку из 7 яиц. 10 июня 1983 здесь же обнаружено три жилых гнезда: в двух были слегка насиженные кладки из 6 яиц, в одном – 2 яйца. Всего (вместе с хорошо сохранившимися старыми) найдено 10 гнёзд, располагавшихся на дубах на высоте 2.5-5 м; размеры гнезда, см: диаметр гнезда 13.5-16.5, диаметр лотка 9.5-11.5, высота гнезда 9-11, глубина лотка 5.5-7.5. Размеры яиц, мм: 27.0-29.0×21.2-22.6.

Усатая синица *Panurus biarmicus*. Ранее на реке Орель отмечена единственный раз в период кочёвок – 11 марта 1923 стайка из 6 птиц (Гавриленко 1929). Нами усатые синицы встречены здесь 16 октября 1982: на озере Займанский лиман держались группы из 2-4 и стайка из 12-15 птиц. Более десятка усатых синиц встречено 10 апреля 1983 на озере Бабино в Зачепиловском районе Харьковской области, а на озере Капинерное 23 апреля – 4-5 птиц. На этих озёрах усатые синицы

держались весь гнездовой период и, несомненно, гнездились. На озере Лошиное в окрестности села Зиньковщица 11 июня впервые отмечен выводок (6-8 птиц). А 12 июня на озере Бабино пара птиц проявляла сильное беспокойство и подпускала на 2-3 м. У других самки и самца, добытых в этот день, половые железы были хорошо развиты. Самый крупный фолликул имел диаметр 7 мм. Такого же размера был один сохранившийся семенник у самца. На озере Кислое у села Зиньковщина 26 июня впервые встречена стайка из 12-15 молодых. Судя по голосам, на озере их держалось намного больше. Излюбленными местами усаток в гнездовой период были тростники, окаймляющие остров на озере Бабино, и небольшие кустики тростника и заросли рогоза центральной части Капинерного озера.

Литература

Булахов В.Л., Мясоедова О.М. 1975. Характеристики колониальных поселений чаек на Днепродзержинском и Запорожском водохранилищах // *Колониальные гнездовья околоводных птиц и их охрана*. М.: 60-61.

Гавриленко Н.И. 1929. *Птицы Полтавщины*. Полтава: 1-133.

Зарудный Н.А. 1911. Несколько заметок по орнитофауне Харьковской и Полтавской губерний // *Орнитол. вестн*. 3/4: 272-277.

Лисецкий А.С., Кривицкий И.А., Ведмедеря В.И и др. 1982. Урочище «Орчик» – уникальный фаунистический комплекс Харьковщины // *Вестн. Харьков. ун-та* **226**: 86-91.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск **1106**: 519*

Летнее нахождение филина *Bubo bubo* в пойме реки Урал у села Коловёртное

В.В.Неручев

*Второе издание. Первая публикация в 1991**

В пойме реки Урал перекличку двух филинов *Bubo bubo* слышали каждую ночь 16-19 июля 1978 в урочище Волчий Яр ниже села Коловёртное.

* Неручев В.В. 1991. Краткие сообщения о филине [Гурьевская область] // Редкие птицы и звери Казахстана. Алма-Ата: 211.