

ISSN 0869-4362

Русский
орнитологический
журнал

2017
XXVI



ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
1404
EXPRESS-ISSUE

2017 № 1404

СОДЕРЖАНИЕ

- 549-550 Благотворитель и охотник Владимир Апостольевич Параскева (1854-1911). Е. Э. ШЕРГАЛИН
- 550-551 Появление саджи *Syrnhaptes paradoxus* в окрестностях Одессы. В. А. ПАРАСКЕВА
- 551-552 Наблюдение окольцованной во Франции самки красноголового нырка *Aythya ferina* на южной окраине Санкт-Петербурга. К. Ю. ДОМБРОВСКИЙ
- 552-563 Северная граница ареала щегла *Carduelis carduelis major* в Западной Сибири. М. П. СУЛЬДИН
- 563-564 Случай тяги вальдшнепа *Scolopax rusticola* в середине дня. Э. В. ГРИГОРЬЕВ
- 564 Гнездование лазоревки *Parus caeruleus* в земляной норе. В. В. БУЧКО, И. В. СКИЛЬСКИЙ
- 565-570 Редкие птицы подмосковных рыбхозов: изменение численности за 20 лет. А. Л. МИЩЕНКО, О. В. СУХАНОВА
- 571 Встречи некоторых редких птиц в Молдавии. Т. ЦИБУЛЯК
-

Редактор и издатель А. В. Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Биолого-почвенный факультет
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

Р у с с к и й о р н и т о л о г и ч е с к и й ж у р н а л
T h e R u s s i a n J o u r n a l o f O r n i t h o l o g y
Published from 1992

V o l u m e X X V I
Express-issue

2017 № 1404

CONTENTS

- 549-550 Philanthropist and hunter Vladimir Apostolevich Paraskeva
(1854-1911). E . E . S H E R G A L I N
- 550-551 The appearance of the Pallas's sandgrouse *Syrhaptus*
paradoxus around Odessa. V . A . P A R A S K E V A
- 551-552 Watching ringed in France female common pochard
Aythya ferina in the southern outskirts of St. Petersburg.
K . Y u . D O M B R O V S K Y
- 552-563 The northern boundary of the goldfinch *Carduelis carduelis*
major range in Western Siberia. M . P . S U L D I N
- 563-564 The woodcock *Scolopax rusticola* roding in the middle of the day.
E . V . G R I G O R I E V
- 564 Nesting of the blue tit *Parus caeruleus* in earthen burrow.
V . V . B U C H K O , I . V . S K I L S K Y
- 565-570 Rare birds of fish farms around Moscow:
change the number in 20 years.
A . L . M I S H C H E N K O , O . V . S U K H A N O V A
- 571 Records of some rare birds in Moldova.
T . T S I B U L I A K
-

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

Благотворитель и охотник Владимир Апостольевич Параскева (1854-1911)

Е.Э.Шергалин

Евгений Эдуардович Шергалин. Мензбировское орнитологическое общество. E-mail: zoolit@mail.ru

Поступила в редакцию 4 января 2017

Среди греков Причерноморья, оставивших после себя орнитологические публикации, был и ныне почти забытый Владимир Апостольевич Параскева (1854-1911). Этот талантливый и великодушный человек заслуживает отдельной публикации.

Предоставим слово краеведу и сотруднику Одесской национальной научной библиотеки имени А.М.Горького Ларисе Владимировне Ижик, которая в книге «Книжные знаки одесских библиофилов» посвятила Владимиру Апостольевичу несколько страниц (2014, с. 87-90).

«Параскева Владимир Апостольевич (1854-1911), владелец кожевенного завода, библиофил. Сын купца 2-й гильдии и основателя крупнейшего и старейшего в Одессе кожевенного завода Апостола Николаевича Параскевы. После смерти в 1885 году отца фирма перешла к его сыновьям Владимиру, Константину и Николаю, возглавил семейное дело старший, Владимир Апостольевич. Завод к тому времени был оборудован «всеми новейшими приспособлениями, облегчающими труд рабочих и улучшающими само производство», третью часть работающих составляли греки «как более выносливые и способные к такого рода работе». По воспоминаниям современников, был очень любим рабочими своего завода. По этой причине, как утверждают газеты того времени, его завод, один из немногих, не бастовал в 1905 году. Был членом Одесского греческого благотворительного общества, основателем греческого клуба «Омония». Видимо это был нетипичный для своего круга человек – жертвовал деньги на устройство библиотек, писал стихи. Ещё подростком он посещал музыкальную школу Общества изящных искусств.

После смерти В.А.Параскева завещал на благотворительные цели около 70000 рублей, из них 10000 – рабочим своего завода, по 2000 – женскому Родонакиевскому училищу (ещё при жизни он подарил этому заведению целый физический кабинет) и греческому мужскому училищу, 50000 – основанной им греческой профессиональной женской школе. В ознаменование его заслуг Греческое благотворительное общество на своём заседании постановило «увековечить имя его золотыми буквами на мраморной доске в Родонакиевской школе и сопричислить его к “великим благотворителям” (евергет). Местная газета с со-

жалением констатировала, что в его лице греческая колония потеряла “благородного человека, идеалиста и горячего патриота”. Проживал в собственном доме (№ 32) по улице Жуковского (бывшая Почтовая)» (Ижик 2014, с. 88-90).

В библиотеке Владимира Апостольевича было более 700 книг. Он был охотником и в 1889 году пожертвовал Новороссийскому обществу любителей охоты 250 рублей на устройство библиотеки при этом обществе. В ответ собрание общества постановило: «На книгах, которые будут куплены на его средства, сделать соответствующие надписи о пожертвовании».

В 1888 году в журнале «Охотничья Газета» Владимир Апостольевич опубликовал небольшую заметку «Появление саджи в окрестностях Одессы» (1888, 2017). Из текста видно, что автор неплохо разбирался в птицах. Страшная болезнь оборвала жизнь этого активного и щедрого человека в возрасте 57 лет.

Литература

- Ижик Л.В. 2014. *Книжные знаки одесских библиофилов. Монографическое исследование*. Одесса: 1-131.
- Параскева В.А. 1888. Появление саджи в окрестностях Одессы // *Охот. газ.* **20**: 230.
- Параскева В.А. 2017. Появление саджи *Syrrhaptes paradoxus* в окрестностях Одессы // *Рус. орнитол. журн.* **26** (1404): 550-551.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1404: 550-551

Появление саджи *Syrrhaptes paradoxus* в окрестностях Одессы

В.А.Параскева

Второе издание. Первая публикация в 1888*

Прочитав в многоуважаемой газете Вашей от 6 мая, в номере 16-м, статью Ф.Лоренца (1888) о вероятном появлении саджи *Syrrhaptes paradoxus* в Европейской России, считаю долгом подтвердить это следующим.

В конце апреля месяца 1888 года я поехал в свой хуторок, прилегающий к деревне Сухой Лиман, вёрстах в 14 от Одессы. Дорога проведена чрез степь из целины, где устраиваются манёвры войск и где обыкновенно мы, одесситы, охотимся на хрустанов, или дерихвостов *Glareola*; ближе к Сухому Лиману, начинаются пахотные поля. Я ехал

* Параскева В.А. 1888. Появление саджи в окрестностях Одессы // *Охотничья Газета* **20**: 230.

с братом, без ружья; кроме хрустанов мы видели табунок из 7 штук каких-то светло-серых птиц величиною с горлицу; они пролетели мимо нас шагах в 20 и сели недалеко на поле. Возвращаясь обратно к вечеру, мы встретили тот же табунок, который расположился в засеянном пшеницей поле, шагах в 40 от дороги. Красота этих птиц и смиренность их очень заинтересовали нас, и мы любовались ими около 5 мин, но пожелав поближе разглядеть их, мы подошли ещё; спугнутые нами, они очень быстрым полётом улетели.

Через неделю нам пришлось опять ехать в хутор. На том же самом месте тот же табунок неизвестных красавцев разгуливал, не обращая даже внимания на наше приближение. В виду научного интереса мы убили пару. Это были птицы, величиною с горлицу, нами ещё невиданные, — именно саджи, степные куры или сростопалы *Syrrhaptes paradoxus*. Внешний вид их совершенно тот же, какой мы читаем у Брэма.

Когда я заканчивал настоящую заметку, ко мне явился знакомый мне крестьянин, Фома Калесниченко, который кроме хлебопашества занимается и охотой, и рассказал, что с 18 марта по 26 апреля 1888 он видел ежедневно много табунов каких-то рябчиков степных, от 4 до 20 штук в табуне. Вероятно, это были тоже саджи.

Л и т е р а т у р а

Лоренц Ф. 1888. Появление саджи (*Syrrhaptes paradoxus*) в Европейской России // *Охотн. газ.* 16: 194.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1404: 551-552

Наблюдение окольцованной во Франции самки красноголового нырка *Aythya ferina* на южной окраине Санкт-Петербурга

К.Ю.Домбровский

Константин Юзефович Домбровский. Государственный Научно-исследовательский институт озёрного и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга (ФГБНУ «ГосНИОРХ»), Набережная Макарова, д. 26, Санкт-Петербург, 199053, Россия. E-mail: k.dombrovsky@yandex.ru

Поступила в редакцию 7 февраля 2017

15 июля 2016 на озере Безымянном в Красносельском районе Санкт-Петербурга (59°43'29" с.ш., 30°06'17" в.д.) я заметил самку красноголового нырка *Aythya ferina* с двумя крупными пуховыми птенцами. В ноздри самки была продета пластиковая метка — так называемая

«носометка» (nasal mark) голубого цвета. В бинокль удалось рассмотреть на ней крупные буквы «НРО». Повторно увидел эту же птицу с птенцами 23 июля 2016. Посещая Безымянное озеро почти до самого ледостава, больше этого нырка не видел.

Сообщив о своих наблюдениях в Центр кольцевания птиц в Москве, выяснил следующие подробности. Эта самка красноголового нырка на первом году жизни была окольцована и помечена носометкой Центром кольцевания Paris Museum 25 ноября 2014 во Франции в департаменте Атлантическая Луара у селения Сен-Фильбер-де-Гранд-Лье (Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 47.05° с.ш., 1.39° з.д.). Расстояние от места кольцевания до места наблюдения составило 2467 км, азимут 56°.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1404: 552-563

Северная граница ареала щегла *Carduelis carduelis major* в Западной Сибири

М.П.Сульдин

Максим Павлович Сульдин. МБУ ДО «Дом детского творчества», 14-й микрорайон, строение 20/1, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628311, Россия.
E-mail: maksimsuldin@yandex.ru

Поступила в редакцию 7 февраля 2017

В окрестностях города Нефтеюганска (61°07' с.ш., 72°36' в.д.) расположенного в Среднем Приобье в долине Юганской Оби (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) щегол *Carduelis carduelis major* относится к эпизодически встречающимся в отдельные годы, малочисленным видам, отмеченным на весенних кочёвках и в гнездовое время (Сульдин 2000, 2003, 2013). Его визуальные и голосовые регистрации (пение и позывки) отмечены в селе Чеускино (8 км к северо-западу от Нефтеюганска) и на близлежащей территории и в пригороде Нефтеюганска. Щеглы встречались в отдельные годы как небольшими стайками до десятка особей, так и поодиночке, в основном в конце марта – апреле, а также в мае и июне, в гнездовое время: 23 марта 1998 (взлетевшая стая из 6-8 особей с вершин деревьев на опушке кедровника), с 9 марта по 3 апреля 1999 (одиночки и стаи до 10 особей и их пение в Чеускино), с 8 по 17 марта 2001 (стая до десятка особей на огородных участках Чеускино), 9 мая 2003 (одиночный поющий самец в осиновом перелеске на околице Чеускино), 22 апреля 2012 (позывки в пригородном хвойно-мелколиственном лесу на лыжной трассе), 7 июня 2012

(одиноким поющий самец на вершине сухостоя здесь же в пригородном лесу). Взрослую особь также видели в гнездовой период 18 июня 2009 в малиновых зарослях окрестностей села Тундрино (61°13' с.ш., 72°03' в.д.) в 31-34 км к северо-западу от Нефтеюганска (Емцев 2009). Эти регистрации указывали на возможность гнездования щегла за пределами известной северной границы гнездовой части ареала. Размножение щегла здесь предполагалось, но оставалось не установленным (Сульдин 2000, 2003, 2013).

В данной местности встречается самый крупный и светлый подвид щегла – сибирский *C. s. major* Taczanowski, 1879 (Коблик и др. 2006).




Рис. 1. Распространение щегла *Carduelis carduelis* в Сибири (по: Рябицев 2014) и район наших исследований.

Согласно современным и относительно недавним данным по распространению щегла в Западной Сибири область его гнездования не доходит до широтного отрезка реки Оби, а в зональном отношении щегол гнездится до среднетаёжной подзоны, практически не проникая в неё (Рябицев 2001, 2014). В прошлом щегол встречался к северу до Тобольска (Тарунин 1928 – цит. по: Гынгазов, Миловидов 1977). Оптимум ареала в Западной Сибири, где наблюдается наибольшая численность и плотность этих птиц в гнездовой период, расположен в зоне лесостепи, а по направлению к северу обилие снижается. В подтайге в гнездовой период щегол тоже обычен, его обилие здесь немного больше, чем в южной тайге (Равкин, Лукьянова 1976; Равкин 1978; Вартапетов 1984; Юдкин 2002). В долине Оби, в пределах южных подзон, численность щегла значительно выше, чем на междуречьях (Вартапетов 1984). В северотаёжной подзоне щегол вообще не встречается (Равкин 1978; Рябицев 2001, 2014). Окрестности Нефтеюганска (подзона

средней тайги, её северная полоса) и более северные районы, таким образом, не входили в область гнездования щегла, считавшуюся расположенной в 125-129 км южнее в районе посёлка Салым (Нефтеюганский район ХМАО – Югра). Следовательно, наиболее северная гнездовая часть ареала располагалась в южных частях ХМАО – Югры, захватывая в основном южнотаёжную подзону (рис. 1). На всех ключевых орнитологических территориях Ханты-Мансийского автономного округа гнездование достоверно не было доказано находками гнёзд или птенцов (КОТР 2006).

Конкретные указания на наиболее северные места гнездования щегла у предела своего распространения в Западной Сибири отсутствуют. Самые северные гнездовые находки находятся на севере Томской области: щегол отмечен здесь обычным на гнездовье в 1972 году в окрестностях деревни Ларино ($60^{\circ}31'$ с.ш., $77^{\circ}41'$ в.д., средняя полоса среднетаёжной подзоны) в 280 км восточнее-юго-восточнее Нефтеюганска (Равкин 1978). Интересно, что в литературе сведений о залётах щегла в северном направлении за пределы гнездовой части ареала тоже почти нет, за исключением случаев, отмеченных автором (см. выше). Так, в окрестностях Ханты-Мансийска щегол начал отмечаться с 1962 года, а в дальнейшем небольшие стайки встречали в апреле раз в 2-3 года (Гордеев 1997). На севере Томской области щегол отмечен в августе 1979 года на послегнездовых кочёвках (Вартапетов, Фомин 1999). В окрестностях села Средний Васюган ($59^{\circ}13'$ с.ш., $78^{\circ}14'$ в.д., Томская область, южная полоса средней тайги) в 354 км юго-восточнее Нефтеюганска, гнездование не установлено, щегол редок (Блинова и др. 2004). Из этого следует, что севернее широтного отрезка Оби в южную полосу северной тайги щегол не проникает даже в качестве залётного.



Рис. 2. Места регистрации щегла на гнездовании. Подчёркнуто красным цветом – отмечен на гнездовании, регистрации слётков; жёлтым – отмечен в гнездовой период, гнездование предполагается.

В 2016 году удалось установить гнездование щегла в дальних окрестностях Нефтеюганска на исследуемой территории (рис. 2).

Три щегла – взрослый с двумя недавно покинувшими гнездо слётками встречены на окраине посёлка Высокий Мыс ($61^{\circ}13'$ с.ш., $72^{\circ}08'$ в.д., левобережье Оби) 18 июня 2016 в 27-30 км к северо-западу от Нефтеюганска. Молодые щеглы в ювенильном оперении, докармливаемые одним из родителей, активно выпрашивали корм у взрослого, предположительно самца (рис. 3).




Рис. 3. Слётки щегла, покинувшие гнездо около 10 дней назад, докармливаемые одним из родителей. Посёлок Высокий Мыс (Сургутский район, ХМАО – Югра), $61^{\circ}13'$ с.ш., $72^{\circ}08'$ в.д. 18 июня 2016. Фото В.А.Чирухина.

Это свидетельствует о том, что птенцы покинули гнездо около 7-10 дней назад. Известно, что после вылета птенцов из гнезда родители кормят их ещё 10-11 (Рябицев 2001, 2014) или 8-10 дней (Ильичёв и др. 1987), или даже ещё меньше – 6-8 дней (Жизнь животных 1986).

По другим данным, кормление слётков продолжается немного дольше – 14 дней (Мальчевский, Пукинский 1983). В период выкармливания, после оставления птенцами гнезда, выводки перемещаются в его окрестностях (Мальчевский, Пукинский 1983; Прокофьева 2001). У юрка *Fringilla montifringilla*, который филогенетически ближе предковой форме вьюрковых (Паевский 2015), выводок в первую неделю после вылета из гнезда перемещался на участке около 8 га (Гаврило 1986). По расчётным данным, начало кладки яиц у наблюдавшихся щеглов пришлось на 7-10 мая, что довольно рано даже для более южных мест гнездования.

Двое молодых с взрослой птицей держались на окраине посёлка на заброшенных огородных участках, заросших дикорастущими травами, на территории бывшего совхоза (рис. 4). Взрослый щегол периодически слетал на землю за пищей. В 50 м от этого места рос березняк с высокими деревьями, где щеглы могли гнездиться; в сотнях метров располагались приусадебные участки, огороды и река Обь.



Рис. 4. Заброшенные огороды бывшего совхоза – местообитание выводка.
Посёлок Высокий Мыс. 18 июня 2016. Фото В.А.Чирухина.

Вторая регистрация щегла в гнездовом наряде в сопровождении двух взрослых произошла в центре села Сытомино (61°18' с.ш., 71°17' в.д., правобережье Оби) 6 июля 2016 в 43-45 км к западу-северо-западу от места встречи в Высоком Мысу и в 70-74 км к северо-западу от Нефтеюганска. Молодой выпрашивал у взрослого корм, его возраст был немного старше птенцов, обнаруженных у окраины Высокого Мыса (рис. 5). Трое щеглов перемещались в проулке между огородами, слетали на поверхность земли для поиска корма, взлетали и присаживались на изгороди огородов приусадебных участков (рис. 6). Ближайший лес находился в 300 м, до реки Оби – 200 м.



Рис. 5. Молодой щегол в гнездовом наряде. Село Сытомино (Сургутский район ХМАО – Югра), 61°18' с.ш., 71°17' в.д., 6 июля 2016. Фото В.А.Чирухина.



Рис. 6. Проулок между огородами и изгороди приусадебных участков – место регистрации щеглов в селе Сытомино. 6 июля 2016. Фото В.А.Чирухина.

Погодные условия, фенологические явления и обстановка в природе, гидрологический режим на данной территории весной и летом 2016 года, когда щеглы были обнаружены на гнездовании, имели следующие особенности. Весна наступила раньше средних сроков, по темпу наступления медленная и продолжительная. Снеготаяние (феноло-

гическая фаза «снежная весна») началось рано, но было не интенсивным. Снеговой покров начал подтаивать и «проседать» с конца марта. Апрель выдался тёплым: в начале апреля максимальные дневные температуры доходили до $+10...+15^{\circ}\text{C}$, но в дальнейшем в некоторые дни температура снижалась и до 0° . Первые слабо заметные проталины на высоких обрывистых местах появились 4 апреля, мощность снегового покрова составляла 20-30 см, «проснулись» рыжие лесные муравьи *Formica rufa*. Практически при сплошном снежном покрове начали проявлять активность жуки-стафилины *Olophrum consimile*, которых в полёте ловили свиристели *Bombycilla garrulus*, взлетая за ними с вершин деревьев. Начало появления обширных проталин на высоких местах 10 апреля (рис. 7) означало переход к фенологической фазе «пёстрой весны» (чередование проталин и участков со снегом), которая продолжалась около 10 дней и закончилась 19-20 апреля.



Рис. 7. Появление обширных проталин на высоких местах. Начало «пёстрой весны». Окрестности Нефтеюганска. 11 апреля 2016. Фото М.П.Сульдина.



Рис. 8. Сход снега в природных местообитаниях. «Голая весна». Окрестности Нефтеюганска. 25 апреля 2016. Фото М.П.Сульдина.

Снег полностью растаял и сошёл в природных биотопах 22-23 апреля, обозначив переход к фенологической фазе «голой весны» — отсут-

ствие снегового покрова и листвы (рис. 8). В это же время на Юганской Оби начался ледоход (раньше средних сроков), он подошёл к окончанию 25 апреля, но на некрупных протоках и озёрах лёд ещё держался; площадь льда по отношению к открытой воде составляла 50% (рис. 9). К началу мая они были уже полностью свободны ото льда (рис. 10).



Рис. 9. Ледовая обстановка на небольших протоках и озёрах 25 апреля 2016. Окрестности Нефтеюганска. Фото М.П.Сильдина.



Рис. 10. Небольшая пойменная протока Чеускина освободилась ото льда, начинает прибывать вода. Окрестности Нефтеюганска. 3 мая 2016. Фото М.П.Сильдина.

В начале откладки яиц щеглами – 7-10 мая – продолжалась «голая весна» (рис. 11). Снег полностью растаял, как и лёд на озёрах и протоках, тогда как в другие годы в это время сохранялись остатки льда и снежного покрова. Щеглы начали откладку яиц при полном отсут-

ствии листвы на деревьях, лишь у рябины *Sorbus aucuparia* лопнули почки. Существенного подъёма воды после ледохода в это время ещё не было, в пойме сохранялся меженный уровень. Погода в этот период была прохладной, температура воздуха составляла +5...+10°C. У берёз *Betula* почки лопнули 16 мая, едва заметная «зелёная дымка» появилась 17 мая – начался переход к «зелёной весне» (рис. 12).



Рис. 11. Фенологическая обстановка в период кладки у щеглов; вид с пойменного болота. Окрестности Нефтеюганска. 9 мая 2016. Фото: М.П.Сульдина.



Рис. 12. Лопнувшие почки берёзы и переход к «зелёной весне». Окрестности Нефтеюганска. 16 и 17 мая 2016. Фото М.П.Сульдина.

Резкое потепление 18 мая до +25...+27°C обусловило то, что 20 мая начала активно распускаться листва у берёз, а 23 мая листья уже развернулись на 30-50%, местность зазеленела. Зацвела черёмуха *Padus avium*. К концу мая деревья полностью покрылись листвой, началось интенсивное цветение рябины, а 26 мая произошло похолодание

до +10°; 30 и 31 мая – до +3...+4°С. Зацветание шиповника *Rosa* 4-5 июня означало переход к лету, его цветение продолжалось, но подходило к завершению 15 июня. Июнь был без характерных похолоданий, умеренно тёплым и без существенных осадков в виде дождей. Июль и август выдались сухими и довольно знойными.

Половодье в 2016 году было выше средней нормы, но ниже критических отметок уровня 2015 года, когда показатели были близки к историческому максимуму (Сульдин 2015). Заметный подъём воды начался во второй декаде мая, максимальных значений он достиг к середине июня, а с конца июня уровень воды в Юганской Оби начал снижаться.

В жизни других видов птиц в течение мая – во время строительства гнезда, откладки яиц, насиживания и первых дней жизни птенцов у щегла – продолжался прилёт и пролёт. В пойме встречались пролётные зимняки *Buteo lagopus*. Отмечены первые встречи: теньковки *Phylloscopus collybita tristis*, мухоловки-пеструшки *Ficedula hypoleuca*, стайки больших улитов *Tringa nebularia* – 9 мая; обыкновенной горихвостки *Phoenicurus phoenicurus* – 12 мая; перевозчика *Actitis hypoleucos*, турухтана *Philomachus pugnax*, лесного конька *Anthus trivialis*, веснички *Phylloscopus trochilus* – 16 мая; стаи белолобых гусей *Anser albifrons* и тулесов *Pluvialis squatarola*, жёлтой трясогузки *Motacilla flava beema*, варакушки *Luscinia svecica* – 17 мая; обыкновенной чечевицы *Carpodacus erythrinus* – 20 мая; зарнички *Phylloscopus inornatus* – 22 мая; белокрылой крачки *Chlidonias leucopterus*, речной крачки *Sterna hirundo*, обыкновенной кукушки *Cuculus canorus*, славки-мельничка *Sylvia curruca*, зелёной пеночки *Phylloscopus trochiloides*, черноголового чекана *Saxicola torquata* – 23 мая; садовой славки *Sylvia borin* – 30 мая. У белобровика *Turdus iliacus* в гнезде 30 мая были недавно вылупившиеся птенцы возрастом около 5 дней. Характерным было то, что с начала мая по первую декаду сентября в окрестностях Нефтеюганска и самом городе были обычны чижи *Spinus spinus*, появление которых в массе было отмечено лишь в 2009 году (Сульдин 2013).

Геоморфологически щегол приурочен к долине Средней Оби – к надпойменным террасам, в пределах которых располагаются населённые пункты. В биотопическом отношении щегол предпочитает окраины города – пригородные смешанные леса, чередующиеся с открытыми пространствами и дачными участками, небольшие деревни и посёлки – Чеускино, Высокий Мыс, Тундрино, Сытомино и их окраины, опушки лесов. Но городские улицы и микрорайоны Нефтеюганска, несмотря на наличие подходящих древесных насаждений, щегол, в отличие от чижа *Spinus spinus* и чечётки *Acanthis flammea*, не посещает. Детальное описание биотопов данной местности приведено в орнитофаунистическом обзоре (Сульдин 2013). Тяготение щегла в гнездовой период к антропогенному ландшафту отмечено также во многих дру-

гих регионах (Блинова и др. 2001; Прокофьева 2001; Наумкин, Демидова 2002; и мн. др.).

Очевидно, что щегол, как и другие виды, встречающиеся на периферии области своего распространения, имеет здесь пульсирующую границу ареала, гнездится нерегулярно и ожидать ежегодного гнездования даже отдельных пар в данной местности не следует. К тому же это – номадный вид, не привязанный к постоянным местам гнездования (Рябицев 2001, 2014). В то же время в условиях современного потепления климата можно прогнозировать дальнейшее распространение щегла по долине Оби в северном направлении и ожидать других его гнездовых находок.

Описанные встречи щегла на Средней Оби являются наиболее северными гнездовыми регистрациями в Западной Сибири и позволяют провести северную границу гнездовой части ареала вдоль широтного отрезка реки Оби (по долине реки), в зональном отношении – по северной полосе подзоны средней тайги. Вид был обнаружен севернее в 133-140 км от известной гнездовой части ареала. Статус щегла на северной границе ареала в Западной Сибири – не ежегодно гнездящийся малочисленный, эпизодически встречающийся на весенних кочёвках вид.

Л и т е р а т у р а

- Блинова Т.К., Громышев И.В., Самсонова М.М., Лютаев И.А., Хабибулина А.М., Мариничева И.Н. 2004. Птицы среднетаёжного Привасюганья // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири* 9: 29-43.
- Блинова Т.К., Мухачева М.М., Романова Н.А., Блинов Л.В., Кудрявцев А.В., Мударисова Г.Р. 2001. Птицы Томского Причулымья // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири* 6: 40-53.
- Вартапетов Л.Г. 1984. *Птицы таёжных междуречий Западной Сибири*. Новосибирск: 1-242.
- Вартапетов Л.Г., Фомин Б.Н. 1999. Птицы долины реки Ларьеган // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири* 4: 66-69.
- Гаврило М.В. (1986) 2008. Организация выводков у юрка *Fringilla montifringilla* // *Рус. орнитол. журн.* 17 (445): 1554-1555.
- Гордеев Ю.И. 1997. К распространению птиц в Ханты-Мансийском округе // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири* 2: 45-48.
- Гынгазов А.М., Миловидов С.П. 1977. *Орнитофауна Западно-Сибирской равнины*. Томск: 1-352.
- Емцев А.А. 2009. Интересные встречи птиц в окрестностях посёлка Сайгатино (Среднее Приобье) // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири* 14: 24-33.
- Жизнь животных. Птицы*. 1986. М.: 1-528.
- Ключевые орнитологические территории международного значения в Западной Сибири. 2006 // *Ключевые орнитологические территории России*. М., 2: 1-336.
- Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.Ю. 2006. *Список птиц Российской Федерации*. М.: 1-288.
- Ильичёв В.Д., Бутьев В.Т., Константинов В.М. 1987. *Птицы Москвы и Подмосковья*. М.: 1-272.

- Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: история, биология, охрана*. Л., 2: 1-504.
- Наумкин Д.В., Демидова М.И. 2002. Птицы Вяткинского заказника и прилегающих территорий в верховьях Сылвенского залива Камского водохранилища // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири* 7: 188-203.
- Паевский В.А. 2015. *Вьюрковые птицы мира*. М.: 1-272.
- Прокофьева И.В. 2001. О поведении щеглов *Carduelis carduelis* в гнездовое время // *Рус. орнитол. журн.* 10 (144): 411-417.
- Равкин Ю.С. 1978. *Птицы лесной зоны Приобья*. Новосибирск: 1-288.
- Равкин Ю.С. 1984. *Пространственная организация птиц лесной зоны (Западная и Средняя Сибирь)*. Новосибирск: 1-264.
- Равкин Ю.С., Лукьянова И.В. 1976. *География позвоночных южной тайги Западной Сибири*. Новосибирск: 1-360.
- Рябицев В.К. 2001. *Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири. Справочник-определитель*. Екатеринбург: 1-608.
- Рябицев В.К. 2014. *Птицы Сибири. Справочник-определитель в двух томах*. М; Екатеринбург: 1: 1-438; 2: 1-452.
- Степанян Л.С. 2003. *Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области)*. М.: 1-808.
- Сульдин М.П. 2000. Заметки по распространению птиц в Среднем Приобье // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири* 5: 178-179.
- Сульдин М.П. 2003. Птицы окрестностей Нефтеюганска // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири* 8: 176-193.
- Сульдин М.П. 2013. Орнитофауна Нефтеюганска и его окрестностей // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири* 18: 127-172.
- Сульдин М.П. 2015. Степной лунь *Circus macrourus* и князёк *Regulus satrapa* в окрестностях Нефтеюганска // *Рус. орнитол. журн.* 24 (1179): 2942-2947.
- Юдкин В.А. 2002. *Птицы подтаёжных лесов Западной Сибири*. Новосибирск: 1-488.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1404: 563-564

Случай тяги вальдшнепа *Scolopax rusticola* в середине дня

Э.В. Григорьев

Эдуард Вячеславович Григорьев. Новоржевский историко-краеведческий музей.

Деревня Дубровы, Новоржевский район, Псковская область, 182457, Россия.

E-mail: edik.grigoriev2016@yandex.ru

Поступила в редакцию 6 февраля 2017

Как известно, тяга вальдшнепа *Scolopax rusticola* (токовые полёты с характерными голосовыми сигналами) происходит на вечерней и утренней зорях. В полнолуние птицы могут тянуть и в середине ночи. Наиболее интенсивная тяга начинается обычно за 50 мин до захода солнца и заканчивается через 90 мин после захода. Утренний пик то-

ковой активности значительно слабее вечернего (Мальчевский, Пукинский 1983; Фетисов, Головань 1999; Храбрый 2016; и мн. др.).

27 мая 2012 в окрестностях деревни Шестово в Новоржевском районе Псковской области мне довелось наблюдать тянущего вальдшнепа в середине дня. В 15 ч 45 мин (время московское) над сырым ольхово-ивовым перелеском протянул одинокий вальдшнеп, издавая характерные «циркание» и «хорканье».

Литература

- Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. *Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: История, биология, охрана*. Л., 1: 1-480.
- Фетисов С.А., Головань В.И. 1999. Материалы по экологии вальдшнепа *Scolopax rusticola* в Псковской области: Размещение, численность, прилёт, размножение // *Рус. орнитол. журн.* 8 (66): 15-25.
- Храбрый В.М. 2016. *Охотничьи животные Ленинградской области*. СПб.: 1-328.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1404: 564

Гнездование лазоревки *Parus caeruleus* в земляной норе

В.В.Бучко, И.В.Скильский

*Второе издание. Первая публикация в 1995**

Лазоревка *Parus caeruleus* как правило поселяется в разнообразных полостях стволов деревьев, в дуплах, а также в искусственных гнездовьях. 27 мая 1994 в окрестностях села Коростовичи Галицкого района Ивано-Франковской области было найдено жилое гнездо в норе глинистого обрыва среди луга на расстоянии 15 м от грунтовой дороги. Длина норки 23 см, размеры входного отверстия 6×7 см. Леток находился на 23 см ниже верхнего края обрыва. Материал гнезда – конские волосы (60% объёма), вата (30%) и перья (10%). В норе находились 7 полностью оперённых птенцов. При нашем приближении 3 птенца вылетели из гнезда.



* Бучко В.В., Скильський І.В. 1995. Гніздування блакитної синиці у земляній нірці // *Беркут* 4, 1/2: 100.

Редкие птицы подмосковных рыбхозов: изменение численности за 20 лет

А.Л.Мищенко, О.В.Суханова

Второе издание. Первая публикация в 2008*

Рыбозаводные пруды являются уникальными угодьями, имеющими характерные особенности, которые отличают их от всех прочих водоёмов региона. Мелководность, ровный профиль дна, сильная эвтрофикация воды, высокая биомасса бентоса и планктона, наличие луговых островов, интенсивное зарастание околотоводной растительностью в сочетании с запретом или ограничением рекреации на большинстве прудов делают их своеобразными рефугиумами для многих видов водоплавающих и околоводных птиц, в том числе для ряда редких видов. Ценность рыбхозов (р/х) для редких видов птиц во многом обусловлена разнообразием и мозаичностью угодий, наиболее ярко выраженными на «Лотошинских» прудах.

Орнитологическим исследованием на прудах р/х мы целиком посвятили полевые сезоны 1980-1983 и 1986-1987 годов. В это время в той или иной степени были обследованы все рыбозаводные пруды Подмосковья, но наиболее интенсивно – р/х «Нара», «Бисерово», «Лотошинский» и Дятловский участок «Клинского» р/х. Целенаправленный, но ограниченный по времени поиск редких видов в четырёх перечисленных р/х, а также в р/х «Егорьевский» и «Малая Истра» был продолжен в 1989-1990 и 1999 годах. В связи с перерывами в работе мы не смогли полностью проследить динамику численности редких видов, но основные тенденции её изменения для многих видов за 20-летний период нам удалось выяснить.

Мы не включили в статью гнездящихся в р/х редких видов, данные по которым не позволяют делать каких-либо заключений об изменении их численности (выпь *Botaurus stellaris*, волчок *Ixobrychus minutus*, малый погоныш *Porzana parva*, пастушок *Rallus aquaticus*, белокрылая крачка *Chlidonias leucopterus*, дроздовидная камышевка *Acrocephalus arundinaceus*, соловьиный сверчок *Locustella luscinioides*, северная бормотушка *Iduna caligata*), а также не гнездящихся видов, встреченных случайно (чёрный аист *Ciconia nigra*, большая белая цапля *Casmerodius albus*, лебеди кликуны *Cygnus cygnus* и шипун *Cygnus olor*, беркут *Aquila chrysaetos*). Не включены и 15 редких видов, встречен-

* Мищенко А.Л., Суханова О.В. 2008. Редкие птицы подмосковных рыбхозов: изменение численности за 20 лет // Редкие виды птиц Нечернозёмного центра. М.: 76-81.

ных в окрестностях прудов в гнездовое время, но практически не связанных с ними трофически.

Черношейная поганка *Podiceps nigricollis*. В начале 1980-х годов населяла 5 р/х области. В «Бисеровском», «Лотошинском» и «Наре» гнезилось не менее чем по 15 пар, в «Егорьевском» и «Осенке» найдено, соответственно, по одному гнезду и выводку. Общая численность вида во всех рыбхозах области в те годы составляла примерно 50 гнездящихся пар. В 1986 году на «Лотошинских» прудах гнезилось не менее 30 пар. В конце 1990-х годов эта поганка отсутствовала в «Лотошинском», «Нарском» и «Егорьевском» р/х, но в то же время резко возросла её численность в «Бисерово» – единственном из р/х области, где сохранились крупные колонии озёрной чайки *Larus ridibundus*. В 1999 году здесь было учтено 59 выводков – вид стал в 1.6 раза многочисленнее чомги *Podiceps cristatus*. Таким образом, суммарная численность этого вида в р/х за 20 лет возросла как минимум в 1.2 раза. Заметный рост численности произошёл и в Фаустовской пойме. Если в 1982 году здесь была найдена лишь 1 колония (7 гнёзд), то в 1999 году лишь на трёх пойменных озёрах (Лебедином, Клиновом и Побежном) учтено 11 выводков.

Красношейная поганка *Podiceps auritus*. В начале 1980-х годов достоверное гнездование отмечено лишь в «Лотошинском» (не менее 10 пар), «Клинском» (Яузский участок, 4 пары) и «Бисеровском» (1 выводок) р/х; 3 взрослые птицы в гнездовое время встречены в «Малой Истре». В 1986 году на «Лотошинских» прудах гнезилось не менее 12 пар. К концу 1990-х годов красношейная поганка в р/х по-прежнему оставалась редким видом, причём общая численность заметно снизилась. В 1999 году взрослые птицы встречены в р/х «Нара» (5 ос.) и «Бисерово» (1 ос.); в «Лотошинском» р/х не отмечена, пруды «Клинского» р/х проверить не удалось.

Белый аист *Ciconia ciconia*. Рыбхозы не принадлежат к числу важных местообитаний этого вида. За рассматриваемый период гнездование было установлено лишь в окрестностях р/х «Лотошинский» (деревня Бородино) и «Нара» (деревня Ерёмино), пруды которых изредка использовались птицами для кормёжки. В обоих случаях гнёзда располагались на металлических водонапорных башнях. В деревне Бородино пара благополучно гнездилась с середины 1980-х годов до 2000 года. В деревне Ерёмино в 1978 году из гнезда успешно вылетели 3 птенца, в 1979 и 1983 годах наблюдались неудачные попытки гнездования (Зубакин и др. 1983; опросные сведения). В последующие годы аисты в районе гнезда отмечены не были.

Серая утка *Anas strepera*. Численность за 20 лет, очевидно, не претерпела существенных изменений. Серая утка – наиболее редкий вид гнездящихся гусеобразных, не превышающий 2% общей численно-

сти уток в р/х. За годы работы найдены лишь 1 гнездо (1982 год) и 1 выводок (1980) в «Лотошинском» р/х. Максимально отмеченное скопление взрослых птиц в гнездовое время насчитывало 12 особей («Лотошинский» р/х, 11 июня 1999).

Связь *Anas penelope*. В летнее время на прудах повсеместно встречаются стаи негнездящихся связей, преимущественно самцов (до нескольких сотен особей в каждом из р/х). Успешное гнездование этого вида отмечено только на «Лотошинских» прудах; брошенное гнездо найдено на «Нарских» прудах в 1982 году. Ни на каких иных водоёмах Подмосковья этот вид на гнездовье нами не встречен. В «Лотошинском» р/х численность гнездящихся связей очень низкая и стабильная. В 1981, 1982, 1986 и 1999 годах учтено соответственно 4, 2, 4 и 3 выводка.

Гоголь *Viscerphala clangula*. Ситуация с этим видом на прудах напоминает таковую со связью, однако в летнее время скопления гоголей на прудах не превышают нескольких десятков особей. Единичные выводки гоголя встречены в «Лотошинском» (1981, 1982 и 1999 годы) и «Клинском» (1980-1982) р/х.

Скопа *Pandion haliaetus*. Численность в р/х за 20 лет не претерпела существенных изменений. По-видимому, единственная пара в течение этого периода гнездилась на территории госкомплекса «Завидово» в районе «Лотошинских» прудов. В гнездовое время взрослые птицы отмечались на этих прудах ежегодно в 1979-1983, 1986-1987 и 1999-2000 годах. Выводок был отмечен 10 августа 1986.

Чёрный коршун *Milvus migrans*. Рыбхозы области принадлежат к важнейшим местам обитания коршуна в Подмосковье. В 1981 году на прудах семи р/х было учтено 22 территориальных пары коршунов. Мы не располагаем данными, достаточными для общей оценки тенденции изменения численности этого вида на прудах за 20 лет. Но по визуальным оценкам в большинстве р/х наблюдается некоторое снижение численности. В «Клинском» р/х (Дятловский участок) численность стабильная: в 1981 и 1999 годах отмечено 4 территориальные пары.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. В 1982-1986 годах в р/х северо-запада области («Клинский» и «Лотошинский») в летнее время несколько раз регистрировались одиночные негнездящиеся орланы. Впервые попытка гнездования была отмечена близ прудов «Клинского» р/х 21 апреля 1988. Однако пара бросила гнездо, по-видимому, не отложив кладку (Николаев и др. 1994). В начале апреля 1982 года в лесу в районе «Лотошинских» прудов на высокой сосне была построена искусственная гнездовая платформа для орланов. В 1982-1995 годах гнездо не использовалось птицами, а в 1996 году пара орланов заселила платформу и успешно вывела одного птенца (Ганицкий 1997; наши данные). Данных по 1997 году у нас нет. В 1998 году орланы самостоятельно построили новое гнездо на сосне в окрестностях платформы и

успешно подняли на крыло одного птенца (С.Мечникова, устн. сообщ.). Возможно, в смене места гнездования сыграл роль фактор беспокойства – в 1996 и 1997 годах к гнезду регулярно подходили юннаты и студенты. В апреле 1999 года орланы посещали это гнездо, но не приступили к гнездованию (или же потеряли кладку). В 2000 году хищники снова загнездились на платформе, построенной нами в 1982 году. Гнездование было успешным, птицы подняли на крыло как минимум одного птенца. Помимо двух упомянутых р/х, гнездование орлана возможно на «Егорьевских» прудах, где в 1990-х годах в гнездовой сезон регулярно встречались одиночные молодые птицы.

Большой подорлик *Aquila clanga*. И в начале 1980-х, и в конце 1990-х годов пара, по-видимому, гнездилась близ прудов «Егорьевского» р/х. 19 сентября 1981 здесь была встречена молодая особь, а 22 июня 1997 – взрослая птица (примерно в том же месте). Жилое гнездо большого подорлика отмечено в районе «Лотошинских» прудов в 1995 и 1996 годах (Ганицкий 1997).

Малый подорлик *Aquila pomarina*. В 1980-1983 годах не был отмечен близ «Лотошинских» прудов, в 1986 и 1994-2000 годах встречался здесь регулярно в числе 1-2 пар, но гнездовые участки менялись по годам. В качестве кормовых угодий птицы использовали в основном пойменные луга, примыкающие к прудам. В 1999 и 2000 годах в районе прудов отмечено успешное гнездование одной пары (Г.Ерёмкин, устн. сообщ.).

Серебристая чайка *Larus argentatus*. Впервые гнездование на прудах было отмечено в 1994 году. В конце мая и начале июня по одной гнездящейся паре найдено в «Лотошинском» и «Клинском» (Дятловский участок) р/х (Зубакин и др. 1998). Несмотря на возросшее в последние годы количество летующих неполовозрелых и взрослых чаек на прудах (включая р\х «Бисерово» и «Нара»), в 1999 и 2000 годах мы не обнаружили в этих рыбхозах гнездящихся серебристых чаек, хотя не исключено, что единичные гнёзда были пропущены.

Малая чайка *Larus minutus*. В начале 1980-х годов пруды р/х играли в области ведущую роль как места гнездования вида. Так, в 1981 году здесь гнезилось около 140 пар, или примерно 35% всей подмосковной популяции. К концу 1990-х годов ситуация кардинально изменилась, вид почти перестал гнездиться на прудах. Полностью прекратили существование небольшие колонии в р/х «Малая Истра», «Лотошинский» и «Нара».

Филин *Bubo bubo*. В 1994 году был впервые отмечен в лесу близ прудов «Лотошинского» р/х, где отсутствовал в предыдущие годы (Мищенко, Суханова 1998). Токовые крики филина регистрировались здесь все последующие годы, в 2000 году было установлено гнездование (В.Никулин, Г.Ерёмкин, устн. сообщ.). Гнездование этой пары фили-

нов, к сожалению, находится под угрозой вследствие регулярного беспокойства орнитологами в период откладки и насиживания яиц.

Зимородок *Alcedo atthis*. За 20-летний период численность вида в р/х не претерпела изменений: зимородок по-прежнему остаётся редким летующим и случайно гнездящимся видом. Одиночные негнездящиеся птицы несколько раз отмечались в р/х «Егорьевский», «Лотошинский», «Бисерово». Гнездование установлено лишь однажды, в мае 1989 года в «Лотошинском» р/х. Гнездовая норка была устроена в стенке магистрального канала, снабжающего водой часть прудов, в 2 м над водой. Норка располагалась в земле рядом с бетонной облицовкой шлюза таким образом, что стадо коров, пасущееся неподалёку, не могло дойти до этого места. В то же время довольно крутые берега протекающей в непосредственной близости реки Большой Сестры, потенциально пригодные для гнездования зимородка, были полностью вытоптаны коровами. 10 мая самка сидела на гнезде очень плотно и вылетела лишь при громком хлопанье в ладоши в 2 м от гнезда.

Тростниковая камышевка *Acrocephalus scirpaceus*. В 1980-х годах при тщательном обследовании потенциальных гнездовых станций ни разу не была отмечена на прудах. Впервые поющий самец был отмечен М.В.Калякиным в полосе высокого тростника на дамбе, разделяющей два пруда «Лотошинского» р/х, в середине мая 1996 года. В этом же месте он был отмечен нами 12 июня 1999. 21 июня 1999 мы обнаружили одиночного поющего самца в массиве густых тростников на пруду р/х «Бисерово». По-видимому, идёт медленное расселение вида по прудам р/х.

Ремез *Remiz pendulinus*. В 1980-е годы в р/х отмечен не был. В 1990-х годах гнездования единичных пар стали отмечаться на «Лотошинских» прудах. Жилое гнездо найдено на пруду в районе деревни Телешово 19 июня 1994. Неподалёку от этого места 14 мая 1995 отмечено старое гнездо. 16 октября 1999 недостроенное гнездо было обнаружено на пруду у центральной охотбазы.

Белая лазоревка *Parus cyanus*. До середины 1980-х годов нигде на прудах в гнездовое время не отмечена. С конца 1980-х птицы стали регулярно регистрироваться на прудах «Лотошинского» р/х. Сюда они, по-видимому, проникали с островов и побережья Шошинского плёса Иваньковского водохранилища, где в конце 1980-х годов встречались регулярно (Николаев и др. 1994). По устному сообщению егеря К.Шавина, имел место случай неудачного гнездования князька в одной из построек охотбазы у пруда. В последние годы численность вида в «Лотошинском» р/х, по-видимому, стабилизировалась, но гнездится всего несколько пар. 8 августа 1999 на одном из прудов нами была встречена молодая птица. В гнездовое время князьки приурочены к группам старых ив с тростником вдоль водозаборных каналов.

В 1990-х годах экологическая ситуация на прудах резко ухудшилась. Многократно снизилось количество комбикормов, вносимых для подкормки рыбы. Это привело к уменьшению трофности воды и сильному ухудшению комовой базы для водоплавающих. Везде, кроме р/х «Бисерово», практически исчезли колонии озёрной чайки. На части прудов стал практиковаться платный любительский лов рыбы, особенно интенсивно – на «Нарских» прудах, которые фактически превращены в рекреационную зону. На этих же прудах сотрудниками охраны р/х проводится бесконтрольная охота в осеннее время. Полностью ликвидирован пруд р/х «Малая Истра». К прудам многих р/х вплотную приблизились дачные участки. Появился новый, весьма сильный негативный фактор – беспокойство редких видов (особенно филина и орлана) орнитологами в начале гнездового периода. Тем не менее, пруды до сих пор поддерживают популяции или отдельные гнездящиеся пары упомянутых выше редких видов птиц (6 из них занесены в Красную книгу РФ, у всех отмечены гнёзда или выводки). Из 18 проанализированных нами видов за 20-летний период только у 3 (красношейная поганка, коршун и малая чайка) наблюдалось снижение численности. Для 3 видов (черношейная поганка, серебристая чайка и тростниковая камышевка) отмечен рост численности. У 12 остальных видов численность, по-видимому, была стабильной. 6 видов начали гнездиться на прудах в течение рассматриваемого периода: орлан-белохвост, малый подорлик, серебристая чайка, филин, тростниковая камышевка, ремез, белая лазоревка. Всё сказанное выше ещё раз свидетельствует о необходимости охраны прудов и прилегающих к ним угодий как местообитаний редких видов птиц. Нам видится перспективным разработка и осуществление специальных природоохранных программ по устойчивому использованию прудов с привлечением сотрудников рыбхозов. Кроме того, крайне важно воспитывать у молодых орнитологов этику работы с редкими видами птиц.

Л и т е р а т у р а

- Ганицкий И.В. 1997. О гнездовании большого подорлика и орлана-белохвоста в Московской области // *Мир птиц* 2 (8): 5.
- Зубакин В.А., Волков С.В., Ерёмкин Г.С., Мищенко А.Л., Фильчагов А.В. 1998. Новые гнездящиеся виды чаек Московской области // *Редкие виды птиц Нечернозёмного центра России*. М.: 181-184.
- Мищенко А.Л., Суханова О.В. 1998. Филин в северо-западном Подмоскowie // *Редкие виды птиц Нечернозёмного центра России*. М.: 234-235.
- Николаев В.И., Мищенко А.Л., Суханова О.В. 1994. Материалы по редким видам птиц района Завидовского заповедника и сопредельных территорий // *Фауна и экология животных Верхневолжья*. Тверь: 52-67.



Встречи некоторых редких птиц в Молдавии

Т.Цибуляк

Второе издание. Первая публикация в 1994*

Горная трясогузка *Motacilla cinerea* впервые отмечена в Молдавии недавно. Мы наблюдали одиночную особь 2 марта 1992 на ручейке в дендрарии города Кишинёва. Впоследствии этот вид наблюдался 12 января 1993, 27 и 29 ноября 1994 на незамерзающем ручейке в центральном парке города.

Красноголовый королёк *Regulus ignicapillus* известен лишь по двум встречам (Аверин и др. 1970). Нами отмечена одиночная самка 10 апреля 1980 в центральном парке Кишинёва, которая кормилась на лиственных деревьях. Вторая встреча красноголового королька состоялась 9 апреля 1992 в пальметном яблонево́м саду возле села Дурлешть в 8 км южнее от предыдущего места. Самец в течение получаса кормился в 2-10 м от наблюдателя. В обоих случаях птицы перемещались в северном направлении. Очевидно, это были представители карпатской популяции, которые осенью опускаются в низинные места, перекочёвывая в юго-восточную часть Европы.

Огородная овсянка *Emberiza cirrus* включена в список птиц республики Молдова как возможно встречающийся вид при отсутствии достоверных данных о находках (Аверин и др. 1970). Нами огородная овсянка впервые отмечена 26 февраля 1984 в Логанештском лесничестве Хынчештского лесхоза (пасмурный день, толщина снега 30-40 см). Самец кормился на лугу возле опушки леса. Вторая встреча состоялась 25 февраля 1991 в пальметном яблонево́м саду возле села Костюжень в 22 км севернее. Самец кормился под молодыми деревцами.

Ближайшие места гнездования всех трёх видов находятся в Карпатах, откуда они, вероятно, и залетают.

Литература

Аверин Ю.В., Ганя И.М., Успенский Г.А. 1970. *Птицы Молдавии*. Кишинёв, 1: 1-240.



* Цибуляк Т. 1994. Встречи некоторых редких птиц в Молдове // *Беркут* 3, 2: 142.